UPUPIDAE

La Abubilla es el único miembro de la familia, presentando además un aspecto inconfundible. Dispone de un largo y curvado pico que utiliza para sondear el suelo en busca de alimento. El color ocre de su cuerpo le hace pasar desapercibida en tierra, sorprendiéndonos al levantar el vuelo y desplegar sus alas blanquinegras, recordándonos a una gran mariposa.

Abubilla *Upupa epops*
Puput
Migrante e invernante

La Abubilla es un ave de tamaño mediano, de 28 cm. de longitud, incluidos los 4-5 cm del pico. Se la puede observar en muy variados ambientes, aunque tiene preferencia por terrenos abiertos con árboles aislados y cultivos de cualquier tipo. Anida en oquedades, aprovechando todo tipo de agujeros, y tiene un periodo de reproducción extremadamente dilatado, dándose citas de parejas criando entre los meses de febrero y octubre.

Su área de distribución se extiende por toda Eurasia y África. Es un residente bastante común en nuestras comarcas, siendo más numerosa en invierno por los ejemplares que vienen a pasar esa época del año procedentes de otras zonas.

En Tabarca se ha detectado la presencia regular de algún ejemplar invernante. El paso migratorio, se inicia ya a mediados de febrero (4 ex. el 18-II-06)con un claro incremento de aves a partir de mediados de marzo (11 aves el 17 de marzo de 2001), que prácticamente solo dura la segunda quincena de marzo. Durante el mes de mayo de 2001, permanecieron en la isla uno o dos ejemplares, observándolos tanto en el Campo (principalmente la zona que media entre La Torre y el Faro, que es lugar habitualmente frecuentado por la especie), así como junto a la Iglesia. Estas citas nos indujeron a pensar en una posible nidificación, que acabamos desestimando puesto que en ningún momento se observó algún ejemplar en vuelo con ceba en el pico (dato muy significativo de presencia de hembra incubando o pollos en el nido), y a que la especie dejó de observarse a partir de finales de mayo. Podría tratarse de ejemplares migrantes tardíos o aves no reproductoras, ya que las abubillas en la costa cercana comienzan a nidificar muy pronto, ya a principios de marzo, e incluso antes. Durante el paso postnupcial, apenas 1 registro de un ejemplar el 11 de septiembre. Otras citas antiguas de Malcom Palmer, correspondientes a este paso postnupcial, son: en 1992, 1 ex. el 25-IX, y en 1999, 1 ex. el 16-IX.

Abubilla *Upupa epops. J. Pérez*

ALAUDIDAE

Incluye alondras, cogujadas, terreras, calandrias, etc., aves de pequeño tamaño y hábitos terrestres, típicas de zonas abiertas, generalmente estepas, cultivos cerealistas, eriales y baldíos, sembrados, barbechos, pastizales, matorral bajo y borde de caminos. Presentan plumajes pardos, que les mimetizan perfectamente sobre el terreno. Poseen alas anchas y colas cortas, con algunas especies que tienen crestas cefálicas o que pueden levantar parcialmente las plumas del pileo. Tienen picos cónicos, cortos y rectos (algunas especies ligeramente más largos y curvados), siendo principalmente granívoros, consumiendo también una buena proporción de insectos y otros invertebrados. Ambos sexos son semejantes, o apenas algo diferentes. Los jóvenes se parecen bastante a los adultos. Poseen cantos muy melodiosos, que emiten desde el suelo, o más habitualmente "colgados" en el cielo. Nidifican en el suelo, por donde corretean con facilidad. La mayoría de las especies son gregarias, formando bandos tras la reproducción. Hay especies sedentarias y otras migradoras. En la provincia de Alicante son regulares 7 especies, aunque 2 de ellas son bastante escasas en nuestras comarcas del sur (Calandria y Totovía).

Cogujada montesina *Galerida theklae. S. Arroyo*

Terrera común *Calandrella brachydactyla*

Terrerola

Migrante

Pequeño aláudido de 14 cm., de color pardo claro, listado de oscuro en las partes superiores, con el pileo ligeramente pardorojizo, y sin cresta, aunque puede levantar ligeramente las plumas de esta zona. Las partes inferiores son blanquecinas y sin listas, aunque los machos presentan una pequeña banda negra a ambos lados del pecho. Poseen un pequeño pico, corto y recto, así como una ceja pálida. Canta principalmente en vuelo, aunque también puede hacerlo desde el suelo. Ocupa zonas abiertas y esteparias: cultivos cerealistas, eriales y baldíos, espartales, viñedos, dunas, etc. Tras la reproducción se vuelven gregarias, formandos grandes bandadas.

Se distribuye por el sur de Europa, ocupando la cuenca mediterránea, llegando hasta los mares Negro, Caspio y Asia central. Es un migrante transahariano. Posee una amplia distribución en la península Ibérica, aunque está ausente en la zona más norteña y Galicia, así como en zonas del interior sin hábitat adecuado. Presente en Baleares y ausente en Canarias.

En Alicante, se reparte irregularmente por hábitats adecuados del norte e interior de la provincia, aunque también aparece cerca de la costa, en el sur de Alicante. Precisamente, las zonas de nidificación más próximas se encuentran en campos de cultivo baldíos y eriales del Altet (incluidos los herbazales del aeropuerto), así como un buen número de parejas en los alrededores de la Laguna de La Mata, y algunos espacios abiertos intercalados entre las urbanizaciones situadas entre Torrevieja y Campoamor. Dentro del hábitat general que puede ocupar esta terrera, se la cita en saladares, sin embargo en los saladares que rodean los humedales del sur de Alicante encontramos otra terrera, la Marismeña.

En la isla de Tabarca, aparecen pequeños grupos, de hasta 15 aves, en el transcurso de sus migraciones, tanto en el paso prenupcial como postnupcial, frecuentando los herbazales del Campo, a menudo coincidiendo con Alondras y Bisbitas comunes. Esta Terrera aparece como nidificante seguro en el Atlas de Aves Nidificantes de la C.V. (observaciones de campo de 1987), sin embargo durante el periodo de estudio no ha nidificado.

Cogujada montesina *Galerida theklae*

Cogullada fosca

Residente

Esta cogujada es ligeramente más pequeña (16 cm.) que la Cogujada común, con el pico más corto y recto, menos pardo arena, y más pardo-grisácea. El listado pectoral es algo más aparente, y la cara inferior de las alas es grisácea. Posee cresta cefálica algo más pequeña que la Cogujada común, y el obispillo es pardorojizo. Los sexos son iguales. El canto es muy melodioso, intercalando con frecuencia imitaciones de otros pájaros, y es también ligeramente diferente de la Común, presentando esta última un "to-to-vía" más débil (de todos modos, para diferenciar por el canto hay que tener un buen oído musical). Se posa con frecuencia en arbustos y árboles.

Es más montaraz que la Cogujada común, habitando en zonas abiertas y esteparias, secas, soleadas y, a menudo, pedregosas, con matorral natural. Evita las áreas cultivadas, y sube más en altitud que la Común.

Su distribución se ciñe a la península Ibérica y norte de África, así como un núcleo en Somalia y Etiopía. En España, se encuentra en la mayor parte de la Península, aunque falta de amplias zonas del norte y del centro. Es la única cogujada que vive en las islas Baleares. Ausente de las islas Canarias.

En la provincia de Alicante aparece principalmente en el interior y la mitad norte, ligada principalmente a zonas montañosas, con matorral natural, y áreas de monte bajo. De todos modos, es una especie difícil de separar de la Cogujada común, por lo que su distribución real es todavía una asignatura pendiente. En el sur de Alicante, podría no ser tan rara, y encontrarla en los alrededores de las lagunas de La Mata y Torrevieja, el embalse de La Pedrera (aquí hay citas de aves anilladas), y zonas montañosas (sierras de Escalona, Orihuela y Crevillente).

En Tabarca la Cogujada montesina es un residente habitual durante todo el año, formando fuera del periodo reproductor pequeños bandos de 5-8 ejemplares. Se posan muy a menudo sobre los arbustos, el vallado perimetral del Faro y las paleras, siendo muy cantarinas, con buen número de imitaciones de otras aves, y emitiendo su trino tanto en vuelo como desde algún posadero. El hábitat utilizado son los herbazales con matorrales dispersos que cubren la mayoría del Campo, donde se alimentan de buen número de semillas silvestres y de una amplia gama de pequeños invertebrados (insectos, gusaños y arañas), incluyendo también en su dieta los rojos frutos del Cambrón (Lycium intrincatum). La población estimada no bajará de 10-12 parejas reproductoras. Se ha observado alguna pareja, portando ceba los dos miembros (indicio de presencia de pollos en nido), ya desde finales de marzo.

También se han encontrado casualmente (¡no se han buscado deliberadamente!) 3 nidos: un primer nido escondido entre la hierba el 5 de mayo, con 4 huevos; un segundo, a finales de mayo, con huevos, y escondido bajo Asteriscus maritimus, y un tercero, a mitad de

junio, con 2 pollos a medio emplumar, e igualmente oculto bajo "Asteriscus maritimus", por tanto deben realizar dos puestas, una a lo largo del mes de marzo, y otra en mayo-principios de junio. Son activas a lo largo de todo el día, con excepción del periodo estival, durante el cual permanecen inactivas durante la parte central del día, debido a las elevadas temperaturas. Aunque es dudoso, podría haber una pequeña población de Montesina en el cabo y la sierra de Santa Pola, que fuese continuidad de las aves de Tabarca.

Alondra común *Alauda arvensis*

Alosa

Migrante e invernante

Es un aláudido de buen tamaño (18 cm.), de color pardo en las partes superiores, con listas oscuras, y las partes inferiores blancas, salvo el pecho que lo presenta listado. El pico es cónico, corto y recto. Posee una discreta cresta, eréctil. La cola es algo más larga que en otros aláudidos, con las plumas externas blancas. También destaca en vuelo, el borde posterior de las alas, de color blanco. En primavera, emite un canto muy melodioso, normalmente en vuelo. Vive en zonas abiertas, pastizales, campos de cultivo cerealistas, dunas, praderas, marismas, eriales y baldíos.

Habita todo el continente europeo, salvo Islandia y el norte de Fenoescandia, así como el norte de África, llegando por Asia hasta el océano Pacífico. En España es más abundante en la mitad norte, rarificándose hacia el sur, donde se acantona principalmente en zonas altas y montañosas. Está ausente de las islas. Es una especie migrante, que inverna en los paises de la cuenca mediterránea (sur de Europa y norte de África). En Alicante se localiza como nidificante en la mitad norte y el interior, en cultivos cerealistas y eriales, así como en zonas montañosas.

En el sur de Alicante es una especie migrante e invernante, aunque alguna pareja podría llegar a nidificar de forma muy ocasional (en este sentido, hay una cuadrícula de nidificación segura en el Atlas de Aves nidificantes de la Comunidad Valenciana, y el 20 de abril de 2000 se observa una pareja, aquerenciada en un erial costero al sur de Torrevieja).

En Tabarca es una de las aves invernantes más características, y fáciles de detectar, por su carácter gregario (forma bandos) y su típico reclamo –una especie de ¡chirrup!-, que emiten al ser levantadas del suelo. Frecuenta las zonas más abiertas del Campo, principalmente herbazales no muy altos, sobre todo los situados junto a la Torre de San José, y entre el Faro y el Cementerio, donde se alimenta de semillas, aunque también puede consumir algunos insectos. Se pueden observar varios bandos, que pueden estar formados hasta por 30-40 aves. Después de pasar el invierno en Tabarca, las últimas alondras nos dejan a final de marzo-comienzos de abril (todavía 3 ex. el 5 de abril de 2002), volviendo a pasar, tras el periodo estival, desde mediados de octubre, solapándose aves en paso o sedimentadas (descansando y alimentándose en la isla), con otras que acabarán quedándose en ella.

HIRUNDINIDAE

Las especies pertenecientes a esta familia, por sus hábitos aéreos disponen de unas formas aerodinámicas, que les convierte en unos consumados voladores. De plumaje oscuro por encima y con tonos claros en las partes inferiores. Su cuerpo es estrecho y compacto, con el pico corto y ancho para capturar pequeños insectos al vuelo. Son cinco las especies de hirundínidos presentes en la península Ibérica.

Golondrina común *Hirundo rustica. L. Fidel*

Golondrina común *Hirundo rustica*

Oroneta

Nidificante

La Golondrina común mide unos 19 cm. de longitud, presentando el dorso oscuro y brillante, con tonos azulados. Las partes inferiores varían del ocre claro de los adultos con plumaje nuevo, al blanco de los jóvenes o adultos con plumaje gastado. Presenta una silueta muy característica con las alas largas y puntiagudas, y la cola muy horquillada.

Es una de las aves más apreciadas por el hombre. Tradicionalmente ha sido considerada beneficiosa por su dieta de pequeños insectos voladores, nidificando durante siglos en granjas y establos. Los cambios ocurridos tanto en la agricultura como en la ganadería durante las últimas décadas han repercutido negativamente en la especie. Las nuevas prácticas agrícolas, de carácter intensivo, y el progresivo abandono del mundo rural, han privado a las golondrinas de una gran cantidad de lugares seguros donde instalar sus nidos. El nido suele ser un cuenco de barro y pajitas, apoyado sobre alguna viga o repisa alta, aunque pueden llegar más raramente a adosarlo al techo.

Es una especie de distribución holártica, cuyas poblaciones europeas migran durante el invierno a África, aunque son frecuentes las observaciones de aves invernantes en los meses de diciembre y enero en algunas zonas cálidas de la mitad meridional de la Península.

Las primeras golondrinas llegan a nuestras tierras en la segunda quincena de febrero. Sin embargo, en Tabarca, la primera observación del año 2001 es de 3 aves el 31 de marzo (en el año 2002 la primera cita es del 23 de marzo). A partir de ese momento se regulariza la presencia de 1 pareja (quizás incluso dos) en el pueblo, observando a estos ejemplares introduciéndose por la ventana abierta de una casa deshabitada de la plaza principal, y desplazándose hasta el islote de La Cantera para recoger barro y lodo en sus orillas, con el que construir su nido. Durante la primavera y el verano se veía algún ejemplar cazando tanto sobre el pueblo como por el Campo, y a principios de agosto observamos el grupo familiar completo entre el puerto y la playa, con los jóvenes esperando ser alimentados por sus progenitores. En migración prenupcial, todavía el 11 de mayo de 2002 se observa el paso de un grupo de al menos 9 ejemplares, en vuelo hacia el norte frente a Punta Falcó. En los meses de septiembre y octubre se produce buen paso migratorio de golondrinas en la isla, periodo en el que se observan nutridos bandos que entran desde Punta Falcó, dirigiéndose claramente hacia el sur, especialmente con vientos moderados de poniente, así como algunos grupos que permanecen sedimentados, cazando insectos voladores a baja altura sobre el Campo.

Avión zapador *Riparia riparia*
Parpalló
Migrante

El Avión zapador es un hirundínido de pequeño tamaño (12 cm. de longitud), por encima de color pardo grisáceo, con franja pectoral del mismo color, que separa la garganta y el vientre blancos. De carácter gregario, excava sus nidos (de más de un metro de longitud) en taludes terrosos situados en las riberas de los ríos o de algunos barrancos.

Se distribuye por todo el Paleártico. Los individuos que nidifican en Europa occidental invernan en el Sahel, por lo que las cíclicas sequías que ha padecido esta región africana han provocado un importante declive de la especie.

En la costa alicantina, las primeras observaciones prenupciales se realizan a finales de febrero. En las cercanas Salinas de Santa Pola hace sus nidos en motas de azarbes, formando colonias que pueden sobrepasar las cincuenta parejas.
En Tabarca, durante el año 2001 se realizan varios registros correspondientes a la migración postnupcial, estando comprendidos entre el 17 de septiembre y el 5 de octubre, con un máximo de 15-20 ex. dirigiéndose hacia el sur el 24 de septiembre.En el año 2002, tan solo es observado un ejemplar, en migración prenupcial, el 12 de marzo.

Golondrina dáurica *Hirundo daurica*
Oroneta cua-rogenca
Migrante

La Golondrina dáurica se parece bastante en tamaño (18 cm.) y aspecto general a la Golondrina común, pero se la distingue fácilmente por el obispillo de color pardo rojizo, aunque a cierta distancia parece blancuzco. Esta especie se encuentra muy ligada a la presencia de agua, y construye unos peculiares nidos de barro pegados al techo, con una cámara central y un conducto tubular de acceso, que ubica en túneles, bajo puentes o en edificaciones abandonadas.

La distribución primaveral en el Paleártico occidental es mediterránea, sobre todo en su orilla norte. La invernada la realiza en el África transahariana.

Durante la segunda mitad del siglo XX, esta especie ha incrementado notablemente su área de distribución en nuestro país. Como el resto de los miembros de su familia, presenta una importante filopatria (fidelidad al lugar de nacimiento), que unido a su carácter extremadamente solitario, puede llevarla a una lenta pero segura colonización de otras

Golondrina dáurica *Hirundo daurica. S. Arroyo*

zonas que le ofrezcan lugares adecuados para nidificar. No obstante, en lugares de la Península donde se ha estudiado a fondo, se han documentado importantes reducciones de sus efectivos, como por ejemplo Gibraltar, (Finlayson y Cortés 1987), pudiendo deberse esta reducción a la expansión del Vencejo cafre (Apus caffer), especie en expansión que utiliza sus nidos para reproducirse, no dudando para ello en desalojar a sus ocupantes.

En la provincia de Alicante, esta bonita golondrina ha aumentado sus efectivos de forma espectacular durante los últimos años. Encontramos buenas poblaciones asociadas al embalse de La Pedrera y los diferentes canales que conducen el agua del trasvase, así como en el río Monnegre. Los lugares donde nidifica, más próximos a la isla de Tabarca, son la Sierra de Santa Pola, cerca de la depuradora de Santa Pola, así como en el Clot de Galvany.

En Tabarca, tan solo una observación de un ejemplar el 13 de junio de 2001, junto a la Iglesia, rondando y explorando la zona más deteriorada de ésta, que unido a una fecha tan avanzada nos llevó a la ilusión de que tal vez pudiese haber una pareja que intentase nidificar. ¡Ya no la volvimos a ver!.

Avión común *Delichon urbica*
Oroneta cuablanca
Migrante

El Avión común es una pequeña "golondrina" de 13 cm. de longitud, de alas relativamente cortas y anchas en la base, cuerpo más rechoncho que otras especies de su familia, y cola corta y levemente ahorquillada. Muy fácil de identificar por su contrastado plumaje, negro en partes superiores, y blanco en las inferiores y obispillo. Está ampliamente distribuido por todo el Paleártico, desde Europa occidental y norte de África hasta Siberia. Las poblaciones europeas invernan en África ecuatorial.

Es una especie muy común en zonas rurales, e incluso urbanas, aprovechando las cornisas y voladizos de los edificios para construir sus nidos de barro en forma de copa, nidificando de forma colonial. En el sur de Alicante se registran algunos ejemplares invernantes.

En Tabarca se ha observado en al menos tres ocasiones durante el mes de abril, en paso prenupcial, tratándose en todos los casos de un ejemplar solitario dentro de grupos migradores de Golondrina común, mientras que tan solo se recoge una observación en el paso postnupcial, a principios de octubre.

MOTACILLIDAE

Engloba bisbitas y lavanderas, pequeños pájaros de costumbres principalmente terrestres, que se mueven por el suelo con facilidad. Son aves esbeltas, y poseen colas largas. Suelen vivir en zonas abiertas, a menudo cerca del agua, así como en herbazales y pastizales. Poseen picos finos, como corresponde a aves insectívoras. Suelen formar bandos fuera de la estación reproductora. Cantan bien o poseen reclamos característicos, que suelen emitir en vuelo. Nidifican en el suelo, entre las rocas o en muros. Los bisbitas son de colores pardos, con más parecido a los aláudidos, siendo los sexos generalmente iguales. Por su parte, las lavanderas son más estilizadas, a lo que contribuye bastante una cola muy larga, que balancean frecuentemente arriba y abajo, mientras deambulan, con un vuelo ondulado, y presentan coloraciones blanquinegras, grises y/o verdeamarillentas. Los sexos suelen ser ligeramente diferentes. En el sur de Alicante son comunes 4 especies de bisbitas (los 3 que se ven en Tabarca, más el bisbita alpino), así como las 3 especies habituales de lavanderas.

Bisbita campestre *Anthus campestris. S. Arroyo*

Bisbita campestre *Anthus campestris*

Titeta d´estiu

Migrante

Es un bisbita grande, de 16 cm., de color general pardo-arena, sin apenas listado en las zonas dorsales, y sin listas en las inferiores (solo los jóvenes las presentan). Posee una aparente ceja pálida, de color pardo claro. La cola y las patas son largas.

Habita en zonas abiertas, secas y soleadas, con escasos matorrales, así como pastizales, baldíos y eriales, principalmente del sur y este de Europa, y de forma más irregular en el centro y norte del Continente. En España, aunque aparece en gran parte de la Península (también en Baleares), su distribución es poco homogénea, ocupando principalmente pastizales, eriales y zonas de montaña, de la Meseta Norte y regiones mediterráneas. Es un migrante transahariano. En la provincia de Alicante es una especie escasa, restringida prácticamente a la mitad norte, nidificando en pastizales montanos de nuestras sierras más altas, así como en eriales y baldíos de zonas más bajas, generalmente en áreas abiertas y esteparias.

En Tabarca es un bisbita escaso, presente tan solo en los pasos migratorios, tanto prenupcial como postnupcial, registrándose unas pocas observaciones, correspondientes a 1-2 aves. Durante la primavera de 2001 se realizan 2 observaciones, una a mediados de mayo y otra a mediados de junio (ésta última probablemente un inmaduro de primer año, que presentan un tenue listado pectoral). Durante la migración postnupcial se observan sobre todo aves adultas, y tan solo un juvenil, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre, que se desplazan por el suelo de los herbazales de la isla, especialmente los situados en la zona norte del Campo. En el paso primaveral de 2002 no se realiza ningún contacto, aunque en 2003 se observan al menos 2 aves el 29 de abril.

Bisbita arbóreo *Anthus trivialis*

Titeta dels arbres

Migrante

Este bisbita es muy parecido al más frecuente Bisbita común, siendo quizás algo mayor y alargado. Las partes superiores son pardo oliva, siendo las inferiores claras, de un color ante pálido, y listadas de oscuro. Las plumas externas de la cola son blancas, y las patas de color carne.

Se encuentra bien repartido por toda Europa, salvo en los paises mediterráneos, donde queda relegado a las zonas más norteñas. Así, en la península Ibérica ocupa tan solo la franja más septentrional, generalmente en áreas montañosas.

Habita zonas abiertas entre campos de cultivo, pastizales, claros o bordes de bosques. Es un migrante subsahariano. En Alicante solo se observan unas pocas aves en los periodos migratorios.

El Bisbita arbóreo es un migrante tan escaso como el Bisbita campestre, recogiéndose tan solo dos observaciones durante el paso postnupcial del año 2001 (ninguna en el prenupcial), con 3 aves el 24 de septiembre de 2001 en herbazales de la cara norte del Campo, algo más abajo de la Torre San José, coincidiendo en la zona con Bisbita campestre. El 2 de octubre se observa un ejemplar en el pueblo, en herbazal-matorral situado a espaldas de la “Casa del Gobernador”. Durante la primavera de 2002, apenas 2 registros más, de aves solitarias y silenciosas, el 5 y 13 de abril, igualmente en herbazales de la cara norte de la isla.

Bisbita común *Anthus pratensis*

Titeta

Migrante e invernante

Es un pájaro insectívoro de 14 cm. de longitud, de color pardo-oliváceo en las partes superiores, con listas ocuras. Las partes inferiores son blancoamarillentas, con moteado oscuro en pecho y flancos. Ceja blanquecina aparente. Las plumas exteriores de la cola son blancas, y las patas son rosadas.

Es un ave de costumbres muy terrestres, habitando zonas abiertas, pastizales y herbazales, matorral bajo y dunas. Se encuentra ampliamente repartido como nidificante por el centro y norte de Europa. Inverna en las regiones mediterráneas. En la provincia de Alicante es un migrante e invernante común.

En Tabarca es un pájaro común durante la invernada, siendo una especie gregaria que forma bandos numerosos (hasta de 30-40 ejemplares) que suelen utilizar los herbazales de todo el Campo de la isla, especialmente los situados alrededor de la Torre de San José y la zona comprendida entre el Faro y el Cementerio, siendo frecuente que coincida con grupos de alondras. Ausentes durante el verano, las primeras aves son registradas a partir de mediados de octubre, con el paso de bandos de bisbitas migrantes, junto con otros que se detienen a descansar y alimentarse en la isla, así como algunas aves que acabarán quedándose a pasar el invierno. Es muy sencillo detectarlos cuando se levantan a nuestro paso, pues emiten un “bis, bis, bis, bis” muy fácil de identificar. Las últimas aves se marchan durante la segunda quincena de marzo, con el paso de bandos migrantes más numerosos, que pueden llegar a las 60 aves. De todos modos, todavía podemos observar algún ejemplar rezagado los primeros días de abril.

Lavandera boyera *Motacilla flava*
Cueta groga
Migrante

Es algo más pequeña (16 cm.) que las otras dos lavanderas. El dorso y el obispillo son verdosos o verde-amarillento, con las alas negras y ribeteadas de blanco, así como la cola, que también es negra, con las plumas exteriores blancas. Los machos "ibéricos" presentan la cabeza gris, con una ceja blanca, y mejillas negras. La garganta es blanca y el resto de zonas inferiores son amarillas. Existen diversas razas en Europa, que se diferencian principalmente por la distinta coloración que presentan los machos en la cabeza. La cola es más corta que en las otras lavanderas.

Vive en las proximidades del agua, en las márgenes de humedales y marismas, así como en herbazales y praderas húmedas, asociándose con frecuencia al ganado vacuno, de donde le viene el "apellido" de boyera, aprovechando la presencia de los animales para capturar los insectos que acuden a ellos, o que éstos espantan a su paso. Nidifica en el suelo, escondiendo bien su nido bajo algún matorral. Se alimenta de insectos que atrapa andando y correteando por el suelo, o en vuelo.

Habita prácticamente en toda Europa, alcanzando incluso el norte de los países escandinavos. También en algunos puntos del norte de África, y gran parte de Asia. En España se encuentra en toda la Península, aunque es más abundante en la mitad norte, ocupando también todos los humedales costeros mediterráneos y atlánticos. De las islas, tan solo nidifica en Baleares. Es un migrante subsahariano.

En Alicante es una especie común en los diversos enclaves húmedos costeros, así como en algunos del interior del sur de Alicante. Además de nidificar, es una especie habitual en los pasos migratorios, especialmente en el paso otoñal, con grandes concentraciones en los alfalfales y otros cultivos situados al sur de El Hondo, y entre éste y las Salinas de Santa Pola. Al anochecer, los bandos acuden a los carrizales para pernoctar.

En Tabarca es un pájaro migrante muy conspicuo, debido a que migra de día, así como por formar bandos que emiten con frecuencia su característico reclamo, fácil de detectar aunque los bandos solo sobrevuelen la isla. El paso primaveral comprende entre final de marzo (1ª observación el 31-III-01) y el 21 de mayo. Precisamente éste último día de mayo, al menos 15 aves. Durante el paso postnupcial, se observan grupitos de forma habitual entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre, con mínimo de 57 aves hacia el sur éste último día de paso. Se han observado algunas subespecies europeas comunes (italiana, alemana, inglesa, escandinava), aunque en general es difícil la identificación debido a la altura de la hierba.

Lavandera cascadeña *Motacilla cinerea*
Cueta torrentera
Migrante

Mide 18 cm., y es la lavandera más grácil y estilizada, debido a la mayor largura de su cola. Posee el dorso y la cabeza de color gris, con una banda ocular blanca. Los machos en plumaje estival tienen la garganta negra. Las alas son negras con ribetes blancos, al igual que la cola, que es negra y con las plumas externas blancas. Las partes inferiores y el obispillo son de color amarillo. De todos modos, la coloración es algo más apagada durante el invierno. Se mueve con un característico balanceo de la cola. Su alimentación se basa en insectos que captura deambulando por el suelo o tras realizar un corto vuelo. Vive en los tramos altos y medios de ríos y arroyos, donde las aguas discurren con rapidez y que presentan orillas con rocas, instalando su nido cerca del agua, en oquedades situadas en puentes, presas, muros, o entre las rocas.

Su área de distribución se extiende por casi toda Europa, llegando por el norte hasta Gran Bretaña y el sur de los paises escandinavos, aunque está ausente de la mayor parte de Rusia occidental. También aparece en algunos puntos del norte de África, alcanzando Turquía y el mar Caspio. Asimismo, ocupa grandes extensiones de Asia centro-oriental. En España se localiza en hábitats apropiados de toda la Península, aunque es más abundante en la mitad norte.

Lavandera boyera *Motacilla flava. S. Arroyo*

Nidifica en las islas Canarias, pero no lo hace en las Baleares. Durante el invierno se produce la llegada de aves migrantes e invernantes europeas, que se suman a las ibéricas, que son residentes, aunque se produce un descenso hacia zonas más cálidas en esta época. Entonces, podemos encontrarlas en ambientes de costa marina rocosa, así como en cuerpos de agua variopintos: ríos, humedales, balsas, canales y acequias, acercándose incluso a pueblos y zonas ajardinadas de las ciudades.

En Alicante, solo aparece como nidificante en la cabecera de algunos ríos de la mitad norte. En el sur de Alicante es un ave muy escasa, tanto en migración como en invernada. De hecho, el registro de 4 aves en 5 km. de un canal de desagüe del embalse de la Pedrera, en enero de 2001, se puede considerar casi excepcional.

En la isla, apenas unas pocas observaciones de paso postnupcial, durante la primera quincena del mes de octubre, correspondientes a ejemplares solitarios, que volaban costeando de norte a sur, posándose un rato en las orillas del islote de La Cantera.

Lavandera blanca *Motacilla alba*

Cueta blanca

Residente, migrante e invernante

Pájaro de 18 cm., esbelto y con la cola larga, de plumaje blanquinegro. Tiene la cara blanca, y el pileo, nuca y garganta negros. El dorso es gris, y las alas están manchadas o listadas de blanco y negro. La cola es negra, con las plumas exteriores blancas. Las partes inferiores son blancas. El pico es fino y de color negro. En invierno las manchas negras de cabeza y garganta son más apagadas. Suele vivir en campos de cultivo, zonas ajardinadas, en general próxima a casas, o bien cerca del agua, como ríos, arroyos y otras masas acuáticas. Puede instalar su nido en el suelo, en muros, en los tejados, entre las rocas, u oculto en la espesura de arbustos o árboles. Durante el invierno, pueden llegar a concentrarse varios cientos de lavanderas para pasar la noche, en dormideros situados en el arbolado de plazas y jardines, carrizales, etc. Es un ave insectívora, que captura a sus presas deambulando por el suelo, o tras realizar un corto vuelo, y que se alimenta en zonas abiertas, generalmente cerca del agua o en lugares con cierta humedad ambiental.

Se encuentra ampliamente distribuida por toda Europa, mientras que en España es común en la mitad norte y levante, rarificándose en la mitad sur, donde suele aparecer ligada a cursos de agua y zonas montañosas. Está ausente de las islas Baleares y Canarias. A la población de aves residentes, se le une gran cantidad de aves invernantes procedentes del norte y centro de Europa, que pasan el invierno principalmente en los paises de la cuenca mediterránea. En la provincia de Alicante tan solo falta en algunas zonas muy montañosas. En el sur de Alicante es una especie común y abundante en los campos de cultivo que rodean algunos de nuestros humedales, frecuentando alfalfales y labrantíos de la zona sur de El Hondo, concentrándose varios cientos de aves cuando estos campos son regados o algún tráctor labra los campos.

En Tabarca es una especie residente habitual durante todo el año. Nidifican al menos 4-5 parejas, con un ritmo de vida a caballo entre la costa y las construcciones humanas de la isla. Las lavanderas se alimentan fundamentalmente cerca de la orilla del mar, acudiendo por ejemplo a La Cantera sistemáticamente, a la costa norte o al islote adyacente a Punta Falcó (La Naueta), e incluso a La Nao. Se localizan 1-2 parejas en el pueblo, próximas a La Cantera y costa sur, así como 1 pareja en las inmediaciones del Castillo, otra en la zona del Cementerio y alguna pareja más por la costa norte. Debe nidificar en oquedades situadas en muros o tejados de casas del pueblo o de las edificaciones situadas en el Campo (Torre de San José, Faro, Cementerio), aunque alguna pareja podría instalar su nido en alguna pequeña grieta de los acantilados que rodean la isla. Hemos observado pollos volanderos a primeros de mayo. Puede haber un paso migratorio, pero muy tenue, quizás en marzo y octubre, siendo algo más numerosa o aparente en dichos meses, aunque sin mostrar un claro desplazamiento hacia el norte o el sur, según la época.

Lavandera blanca *Motacilla alba. J. Pérez*

TROGLODYTIDAE

Tan solo una especie de esta familia, el Chochín, nidifica en Europa. Son pájaros pequeños o muy pequeños, inquietos, de cuerpo rechoncho, con alas cortas y redondeadas y cola también corta, que levantan con mucha frecuencia, aspecto éste muy característico de estos pájaros. Poseen coloraciones pardas, con barreado más oscuro. Tienen el pico fino, típico de un ave insectívora. No presentan dimorfismo sexual. Son aves muy escondedizas, y típicas de vegetación arbustiva densa, que suelen nidificar en agujeros o entre la espesura, realizando nidos globosos. Cantan muy bien.

Chochín *Troglodytes troglodytes*
Caragolet
Invernante

Pajarillo de apenas 9 cm. de longitud, regordete, de color pardo con barreado en los flancos, alas y cola. La cola es corta y la mantiene a menudo levantada. Las partes inferiores son algo más claras. Es un pájaro difícil de observar, pero fácil de localizar por su peculiar y fuerte canto. Muy inquieto, rebuye entre el follaje como si fuera un pequeño ratón. Vive en zonas de vegetación densa, así como en bosques con abundante sotobosque, sotos fluviales, jardines y setos. Con frecuencia junto a roquedos y acantilados. Sitúa su nido en oquedades de paredes rocosas o árboles, así como entre la vegetación. Es un pájaro insectívoro.

Está presente en toda Europa, salvo en las regiones más norteñas de Escandinavia. También aparece en el norte de África, Asia y Norteamérica. Por su parte, en España se encuentra bien repartido por toda la Península, siendo más abundante en la mitad norte, quedando relegado en la mitad sur a las zonas más frescas y umbrosas (sotos fluviales y áreas montañosas). Igualmente, nidifica en Mallorca, con ausencia en el resto de islas Baleares y Canarias.

En Alicante ocupa la mitad norte, aunque algunas parejas pueden nidificar en vertientes de umbría de algunas sierras del interior y mitad sur. En general, se asocia a zonas de montaña en exposiciones de umbría, y márgenes de ríos. En el sur de Alicante se observa algún ejemplar durante el invierno, generalmente en los sectores más frescos y umbríos (barrancos de la Sierra de Santa Pola, zonas de espesa vegetación del Clot de Galvany, y en los carrizales de El Hondo).

En Tabarca, apenas tenemos el registro de un ejemplar el 21 de enero, observado escondiéndose en espesura de Cambrón y Oroval, próximos al grupo de paleras situado entre el Faro y el Cementerio. No deja de sorprender esta observación, pues al Chochín le gustan los lugares más umbríos y frescos, con una buena cobertura vegetal, que contrasta con la sequedad ambiental y la escasa cubierta vegetal de la isla. De todos modos, este invierno fue particularmente lluvioso, dejando un precioso tapiz de hierba verde en todo el Campo.

TURDIDAE

Esta familia de paseriformes está formada por un buen número de especies (41 especies nidifican en el Paleartico occidental), con aves de mediano tamaño (zorzales) y un muy variado grupo de especies menores, y a menudo de vivos colores (colirrojos, collalbas, roqueros)

Alzacola *Cercotrichas galactotes. A. Saiz*

Alzacola *Cercotrichas galactotes*
Cuaenlairat
Migrante

La apariencia, forma y tamaño (15 cm de longitud) y su generalmente tímido carácter, recuerdan al Ruiseñor, aunque si se le observa en buenas condiciones de luz, y el tiempo suficiente, es inconfundible, con un plumaje pardo claro en partes superiores, y blanquecino en las inferiores, y su larga cola de color pardorrojizo (enmarcada en su extremo por unas llamativas manchas blanquinegras), que mantiene enhiesta a menudo, justificando plenamente su nombre en castellano y valenciano. Lista ocular negra, y ceja pálida. Se alimenta comunmente de insectos que encuentra en el suelo, por donde se desplaza con rápidos saltos, aunque es también frecuente observarle posado en piedras, arbustos o pequeños árboles.

Se distribuye en dos núcleos importantes: el occidental, que engloba el norte de África (desde el norte del Sáhara occidental hasta Libia) y el sur de la península Ibérica, y un núcleo oriental, más amplio, que se extiende por una franja entre Grecia, Turquía y Oriente Próximo, hasta el norte de Afganistán. Es un migrante transahariano, aunque en África central existen poblaciones sedentarias aisladas. En la península Ibérica se distribuye principalmente en la mitad sur, estando ausente de las islas Baleares y Canarias. Llega de sus cuarteles de invernada africanos a finales de abril y principios de mayo, marchando nuevamente durante los meses de agosto y septiembre.

El hábitat preferido por la especie en Alicante son cultivos arbóreos de secano con olivos, algarrobos y almendros, aunque la desaparición de estos cultivos tradicionales ha rarificado considerablemente al Alzacola en nuestras comarcas, recluyéndole en linderos de pinares y pinares abiertos. Las zonas de cría más próximas de la especie, están situadas en la cercana Sierra de Santa Pola, en la Sierra del Molar y en los montes aledaños del Clot de Galvany. Lugares muy similares entre sí, montes pedregosos con pinos carrascos (Pinus halepensis) de pequeño porte, donde instala sus nidos.

En Tabarca, durante el periodo de estudio, tan solo dos observaciones en el paso prenupcial. La primera, el 14 de mayo de 2001, con 1 ex. (quizás 2), moviéndose por la zona de las paleras y el matorral junto al vallado del Faro, posándose sobre éste y aguantando nuestra presencia cercana. La segunda, el 10 de mayo de 2002, correspondiente a un ejemplar en el jardín situado junto a la Iglesia, que se encontraba posado en una buganvilia cercana, desde la que se lanzaba al suelo, donde rebuscaba alimento, moviéndose con sus típicos saltitos. Como cita antigua, Malcom Palmer observa un ejemplar el 21 de mayo de 1996.

Petirrojo *Erithacus rubecula*
Pit-roig
Migrante e invernante

Este rechoncho y simpático pajarillo, de unos 13 cm. de longitud, tiene las partes superiores de un color pardusco y presenta una característica mancha roja herrumbrosa que se extiende desde la cara hasta el pecho. Cría en terrenos arbolados, linderos de bosque o jardines, donde se mezcle vegetación densa y zonas abiertas, siempre que estos lugares tengan un mínimo de humedad. Se alimenta de insectos, caracoles o gusanos. Instala sus nidos en toda clase de huecos o grietas.Se distribuye por el Paleártico occidental, desde el noroeste de África y península Ibérica hasta el Cáucaso y el centro de Rusia. La Península y Baleares acogen a un importante número de invernantes procedentes de Europa, además de las propias poblaciones ibéricas de zonas frías y montanas que se trasladan a zonas más templadas.

Petirrojo *Erithacus rubecula. J. Pérez*

Es un invernante habitual en el sur de Alicante. Nidifica en laderas de umbría de las sierras del interior de la provincia, como Maigmó, Mariola y Salinas, aunque es posible que alguna pareja nidifique en zonas umbrías de jardines de la ciudad de Alicante, Santa Pola del este, y algún palmeral de la ciudad de Elx, con un mayor grado de humedad, debido a que son regados con frecuencia.

Algunos ejemplares invernan en la isla, frecuentando sobre todo la zona de paleras entre la Torre y la Casa del Campo. Las últimas observaciones se realizan a finales de marzo o principios de abril (31/III/01 y 5/IV/02). Reaparece a finales de septiembre (día 27 de IX), con máximo en paso durante la segunda quincena de octubre (Malcom Palmer, en 1994, realiza una estima de unos 200 ejemplares, el 17 de octubre).

Ruiseñor común *Luscinia megarhynchos*
Rossinyol
Migrante

Es un pequeño pájaro de 16 cm. de longitud, famoso por su canto. Posee las partes superiores de color pardo-rojizo, con la cola rojiza, y partes inferiores pardo-claro. No es un pájaro fácil de observar, debido a su carácter tímido y escondedizo, aunque su melodioso canto nos revela rápidamente su presencia. Suele comer en el suelo, consumiendo insectos y algunos frutos y, si podemos sorprenderle, le veremos en posición erguida, con las alas ligeramente caidas y la cola algo levantada. Durante el periodo reproductor, canta tanto de día como durante la noche. Habita en bosques con abundante sotobosque, sotos, así como en lugares de espesa vegetación a base de densos matorrales y arbustos, jardines y setos.

Nidifica en el sur, centro y oeste de Europa, alcanzando por el norte Gran Bretaña pero no los paises escandinavos. También ocupa el norte de África, regiones limítrofes con el mar Negro, y gran parte de Asia. En España se encuentra ampliamente repartido, pero es muy escaso en la cornisa cantábrica.

En Alicante es más común en la mitad norte de la provincia, aunque igualmente aparece en las zonas más umbrías y frescas del sur. Precisamente, en nuestras secas comarcas del sur de Alicante, falta en amplias zonas, aunque le encontramos, por ejemplo, en el paraje del Clot de Galvany, así como en huertos de naranjos y limoneros de la huerta ilicitana que linda con el río Vinalopó, así como la adyacente al río Segura, zona norte de La Mata, y en palmerales. En Tabarca, durante el año 2001, apenas 2 registros primaverales, en jardines de algunas casas exteriores del pueblo, con 2 aves el 5 de mayo y 1 ex. oido cantando el 7 de mayo.

En paso postnupcial, 1 ejemplar el 11 y 17 de septiembre, muy bien escondido entre la espesura de paleras y orovales entre la Torre y el Faro. En la primavera de 2002, los primeros contactos se producen el 5 de abril, en el principal sector de paleras y un último contacto acústico (1 ejemplar cantando oculto en paleras y orovales) el 11 de mayo.

Ocasionalmente, puede darse algún registro primaveral temprano: Así, Malcom Palmer, en 1988 observa 2 aves ya el 19 de marzo. Es un pájaro muy escondedizo, pero al volar entre la maleza, para ocultarse rápidamente, le delata su cola de color rojizo, que resalta ligeramente sobre el plumaje pardorojizo de las plumas del dorso del cuerpo. De vez en cuando, duda unos instantes antes de zambullirse en la espesura, lo cual permite una breve pero completa observación del Ruiseñor.

Pechiazul *Luscinia svecica*
Pit-blau
Migrante

Mide 14 cm. de longitud, y es un pájaro en el que los machos poseen una característica pechera (incluida la garganta) de intenso color azul, enmarcada por abajo por una banda de color pardorojizo. La pechera azul puede poseer una mancha central ("medalla") blanca, roja (aves escandinavas), o ser uniformemente azul. La cabeza y el dorso son parduscos, con una ceja blanca. La cola, que muestra frecuentemente alzada, al final posee una banda negra, con pardorojizo en los bordes, muy llamativa en vuelo, aunque le hayamos visto breves instantes. Las hembras tienen un plumaje más discreto. El hábitat donde vive consiste en arbustos y diversa vegetación asociada a medios próximos al agua (en invierno), así como matorral de tundra y zonas altimontanas (en periodo reproductor).

Pechiazul *Luscinia svecica. T. Zaragozí*

Nidifica de forma fragmentaria en el centro de Europa, ampliando su área de distribución por Fenoescandia, Paises Bálticos, Rusia y Siberia. En la península Ibérica se reproduce en algunas zonas montañosas del norte (Sistema Central y Cordillera Cantábrica), en matorrales de alta montaña: brezales, piornales, enebros, etc. También se produce la invernada de buen número de aves, ligadas principalmente a la vegetación palustre de zonas húmedas. Así, en el sur de Alicante, es muy común durante el invierno en El Hondo, y también, aunque algo menos, en el resto de aguazales.

En Tabarca, apenas dos observaciones fugaces, de aves muy escondedizas, en ambos pasos migratorios: un ejemplar el 31 de marzo de 2001, y otro el 2 de octubre, que se ocultaban entre la vegetación que rodea un pequeño campo de fultbol situado entre el pueblo y la muralla, detrás de la casa del Gobernador.

Colirrojo tizón *Phoenicurus ochruros*
Cua-roja fumada
Migrante e invernante

Esbelto paseriforme de unos 14 cm. de longitud, con plumaje gris ratón las hembras y los ejemplares inmaduros; los machos adultos tienen un plumaje gris con cara y pecho negros, además de contrastadas marcas alares de color blanco (subespecie *gibraltariensis*, la común en Europa) y cola y obispillo rojo herrumbroso, característica que le da nombre. Acostumbra a posarse en piedras, vallas, postes etc... donde se mantiene erguido y realiza un movimiento vibrante con su cola de color cobrizo. Es una especie rupícola, con preferencia por los cantiles y zonas abiertas y pedregosas de las montañas. En la península Ibérica llega a nidificar hasta los 2.300 m. de altitud en la Sierra de Gredos, los 2.700 en los Pirineos orientales o los 3.300 en Sierra Nevada.

Su área de distribución se extiende por latitudes medias del Paleártico Occidental y Central, desde la península Ibérica hasta Mongolia y China. Los ejemplares ibéricos de la especie abandonan los pisos más montanos y fríos para distribuirse por zonas más cálidas del entorno peninsular.

En Alicante, nidifica en los macizos montañosos del noroeste de la provincia, siempre por encima de los 400 m. de altitud, en zonas con roquedos y acantilados.

En Tabarca es un invernante habitual, con presencia de unos pocos ejemplares, generalmente individuos hembras y/o juveniles (algún año puede ser incluso numerosa, con estimación, de Malcom Palmer, de más de 40 ex. en diciembre de 1994). Los colirrojos se marchan entre finales de marzo y principios de abril, con última observación en 2001 el 19 de marzo, y en 2002, última cita de 1 hembra el 5 de abril. Es también destacable su presencia durante los pasos migratorios, contabilizándose al menos 30 ejemplares el 19 de marzo de 2002, en el camino situado entre los grupos de paleras, entre el Castillo y el Faro. Nuevamente, reaparece a partir de comienzos de octubre (1ª cita posnupcial el 2 de octubre de 2001).

Colirrojo real *Phoenicurus phoenicurus*
Cua-roja reial
Migrante

El Colirrojo real mide unos 13,5 cm. de longitud, y se diferencia fácilmente del Colirrojo tizón por su pecho anaranjado, de tono suave en las hembras e inmaduros, y más intenso en los machos adultos. Además, posee un comportamiento ligeramente más discreto que éste, observándose frecuentemente en zonas de arbustos o arbolado abierto. Es un ave que instala sus nidos en huecos de árboles, rocas o muros de piedra, siendo otra de las especies forestales que se ha beneficiado de la instalación de cajas nido.

Su área de distribución primaveral se extiende por prácticamente todo el Paleártico occidental. El Colirrojo real es una especie migradora que inverna en el África subsahariana.

Colirrojo tizón *Phoenicurus ochruros. J. Pérez*

En la Comunidad Valenciana tan solo cría en algunas zonas montañosas del interior de la provincia de Castellón. En el sur de Alicante, solo es posible observar a esta especie durante los pasos migratorios.

En Tabarca, el paso prenupcial discurre entre el 17 de marzo y mediados o finales de mayo. Por su parte, el paso postnupcial es más breve, entre el 8 de septiembre y el 19 de octubre. Frecuentan áreas de matorral aislado, o el borde de los grupos de paleras y orovales. También pueden observarse algunos ejemplares en el grupo de palmeras que hay junto a la Iglesia. Las observaciones no superan generalmente las 10 aves. De todos modos, ocasionalmente puede verse un número mayor: así, el 10 de mayo de 2002, se contabilizan más de 20 ejemplares.

Tarabilla norteña *Saxicola rubetra*

Bitxac rogenc

Migrante

La Tarabilla norteña (13 cm.) es fácil de diferenciar de su pariente la Tarabilla común, sobre todo por la conspicua ceja que presenta en todos los plumajes, crema en hembras e inmaduros, y blanca en los machos adultos. Estas dos especies tienen un comportamiento y exigencias alimentarias similares. Sus hábitats preferidos son las zonas abiertas con pastizales y matorral, así como campos con arbustos, setos y brezales.

Tarabilla norteña *Saxicola rubetra. A.J. Ramos*

Tarabilla común *Saxicola torquata*. *T. Zaragozí*

Su área de reproducción se extiende por todo el Paleártico occidental, excepto en sus áreas más meridionales, estando presente en toda Europa, salvo en Islandia y algunas regiones mediterráneas. La invernada la realiza en el África subsahariana.

Es una especie habitual en Tabarca durante los pasos migratorios, siendo uno de los lugares donde con mayor facilidad la observaremos en el sur de Alicante. La migración primaveral se produce entre el 24 de abril y el 14 de mayo, y la otoñal entre el 17 de septiembre y el 19 de octubre. Se la puede observar en zonas abiertas con matorral disperso, aunque también se introduce en sectores con vegetación más densa, como son los grupos de paleras y orovales situados entre La Torre de San José y el Faro, y entre éste y el Cementerio, generalmente entre 1-10 aves.

Tarabilla común *Saxicola torquata*
Cagamànecs
Migrante e invernante

La Tarabilla común es un paseriforme eminentemente insectívoro, de unos 12,5 cm. de longitud. Presenta un claro dimorfismo sexual. Así, los machos tienen la cabeza negra, con una alargada mancha blanca a los lados del cuello, y el pecho anaranjado. Por su parte, las hembras tienen las partes superiores de color marrón, con los bordes de las plumas de un tono más claro, excepto unas pequeñas manchas blancas en las alas.

Su área de distribución se extiende por todo el Paleártico, salvo una importante zona entre Escandinavia y los Montes Urales, donde está ausente. En la península Ibérica, se produce una entrada otoñal de aves europeas, así como un desplazamiento de aves ibéricas desde las zonas más frías a zonas más cálidas, generalmente cerca de la costa.
La especie cría en todo el sur de Alicante, principalmente ligada a los saladares periféricos de nuestros humedales, donde resulta una especie común. Durante el invierno se produce un importante incremento de la población debido a la presencia de gran número de tarabillas invernantes, siendo una de las especies más comunes y habituales en zonas abiertas con matorrales, arbustos, e incluso arbolado aclarado.

Es un pájaro fácil de observar, pues se posa al descubierto, sobre el matorral disperso del Campo de la isla, desde donde caza insectos que atrapa en el suelo, o incluso captura tras realizar un corto vuelo. También puede posarse en las formaciones más densas de paleras y orovales, generalmente en el límite con las zonas más abiertas.

Se han realizado observaciones invernales de al menos 10-12 ejemplares, que permanecen en Tabarca hasta mediados de marzo, momento en el que abandona la isla hacia sus lugares de nidificación. Después del periodo reproductor, vuelve a presentarse a partir de mediados de septiembre, siendo ya regular durante todo el otoño-invierno

Collalba gris *Oenanthe oenanthe*
Còlbit gris
Migrante

La Collalba gris tiene una longitud media de 15,5 cm, el color del plumaje varía en buena medida dependiendo de la edad, sexo y época del año. En primavera, los machos poseen un plumaje en las partes superiores de color gris, con las alas negras. Partes inferiores blancas, con pecho de color ocre-anaranjado. La hembra es menos contrastada que el macho, con partes superiores de color pardo-grisáceo. Ambos sexos poseen obispillo blanco y destacada cola blanca, terminada en una “T” negra..

Es la más extendida de las collalbas y la única que cría en el norte de Europa. Tiene una amplia área de distribución, que se extiende por todo el Paleártico, entre la península Ibérica y el norte de África, por el oeste, llegando hasta las costas de Siberia en el Océano Pacífico, además de ciertas zonas del Neártico, como Groenlandia, Canadá y Alaska.

Collalba gris *Oenanthe oenanthe. S. Arroyo*

En la provincia de Alicante es un reproductor escaso e irregular, nidificando en la Font Roja y en la Sierra de Salinas, también ocasionalmente se ha reproducido en cultivos abandonados junto al pueblo de Pinoso, así como en zonas abiertas de matorral, secas y pedregosas del Alto Vinalopó. Hasta hace unos años alguna pareja se reproducía en Torrevieja, en la costa rocosa del cabo Cervera, hasta su masiva urbanización.

En Tabarca, es una de las especies más características y numerosas en los periodos migratorios. Suele deambular por el suelo del Campo, aunque se pueden observar ejemplares en el islote de La Cantera, y el borde sur del pueblo. Le gusta encaramarse en cualquier pequeño desnivel del suelo, como mojones y piedras, así como matorrales, desde donde puede tener mejor visibilidad. El paso prenupcial, se extiende entre el 17 de marzo y el 28 de mayo, siendo más intenso desde mediados de abril a mitad de mayo (la primera cita de 2002 se produce el 23 de marzo). La migración postnupcial se ha detectado entre el 8 de septiembre y el 26 de octubre .A veces, pueden contabilizarse más de 20 ejemplares prácticamente juntos, especialmente en la cara norte de la isla, siendo una especie en general bastante común en ambos pasos, e incluso abundante. En este sentido, Malcom Palmer, en 1994, detecta fuerte paso de migrantes el 22 de abril, con estimación de unas 250 aves.

Collalba rubia *Oenanthe hispanica*

Còlbit ros

Migrante

La Collalba rubia es un pájaro insectívoro, de unos 14,5 cm. de longitud, que presenta una importante variedad de plumajes en función de la edad, sexo, época del año y fase. Los machos en primavera tienen el píleo, cogote y babero de color ocre, de mayor o menor intensidad, y una mancha negra entre las auriculares, los ojos y la garganta, pudiendo variar esta mancha en los machos de la otra fase de plumaje (garganta pálida) por un simple antifaz negro entre el pico y las auriculares, con partes inferiores de color blanco. Las alas en las dos fases son completamente negras. Las hembras y machos en plumaje invernal pueden presentar un plumaje con tonos desde el ocre al crema, con las alas de tonos más oscuros que el resto. En esa época del año es parecida a la Collalba gris y mantiene un comportamiento similar a ésta. Cría en zonas abiertas con matorrales y árboles aislados, en terrenos pedregosos de tipo mediterráneo cálido.

Su distribución primaveral se extiende por todo el Mediterráneo, llegando incluso a las costas del mar Caspio. Es un migrante transahariano. En la provincia de Alicante es una especie común, ocupando generalmente zonas abiertas y pedregosas, con matorral, así como cultivos de secano. El lugar más cercano a la isla de Tabarca donde nidifica esta especie es la sierra de Santa Pola.

En Tabarca es menos común que la Collaba gris, y se presenta principalmente durante el paso prenupcial, entre el 17 de marzo y el 14 de mayo, posándose tanto en el suelo, como sobre los matorrales aislados entre los herbazales del Campo de la isla. El paso postnupcial es muy discreto y tempranero, con apenas 2 registros entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre.

Roquero solitario *Monticola solitarius*

Merla blava

Invernante

El Roquero solitario es un paseriforme de tamaño medio, con unos 22 cm de longitud, ligeramente más pequeño que un mirlo, esbelto y con el pico largo. El macho dispone de un plumaje azul oscuro, y la hembra es de un tono general marrón oscuro, aunque en el vientre presenta barras alternas oscuras y ocres. Es un ave básicamente sedentaria, aunque se apunta la posibilidad de que algunos ejemplares procedentes de zonas norteñas y montañosas, realicen movimientos otoñales dispersivos. Como su nombre indica, está asociado a roquedos y cantiles, de cualquier tipo de material, ya sean calizos, areniscas o conglomerados. El límite altitudinal de la especie en la península Ibérica se encuentra entre los 1.600 m. en Sierra Nevada y los 1.200 m. en el Sistema Ibérico.

Collalba rubia *Oenanthe hispanica*. *L. Fidel*

Su área de distribución se extiende por todo el Paleártico, a través de una franja que discurre entre el norte de África y las islas Británicas en su extremo occidental, hasta China, Japón y Corea, en las costas del océano Pacífico.

El área de reproducción más cercana a la zona de estudio se encuentra en la Sierra de Santa Pola, en el frente acantilado y construcciones del cabo de Santa Pola, donde se han contabilizado 2-3 parejas de esta especie.

En Tabarca se han realizado observaciones invernales entre el 13 de octubre y el 10 de febrero, generalmente machos solitarios o aves inmaduras, aunque hay una cita de dos aves (macho y hembra, o inmaduro) el 2 de febrero de 2001, posados en la Torre. Su presencia en la isla puede deberse tanto a aves procedentes del cabo de Santa Pola, o bien a ejemplares que realicen pequeños movimientos dispersivos desde zonas montañosas del interior de la provincia, e incluso de regiones más lejanas.

Roquero solitario *Monticola solitarius. S. Arroyo*

Mirlo capiblanco *Turdus torquatus*

Merla de pit blanc

Migrante

En un pájaro muy parecido al Mirlo común, tanto en tamaño (24 cm.), como por su plumaje negro, aunque esta especie luce una llamativa mancha blanca en el pecho, en forma de medialuna. Presenta también al volar unos destellos blancoplateados en las negras alas. El pico es amarillento. Las hembras son de color pardo-oscuro, con la mancha blanca pectoral más tenue. Posee un reclamo muy característico, en forma de un ¡tac-tac-tac!, repetido.

Nidifica en Escandinavia, Gran Bretaña e Irlanda, así como en zonas de alta montaña del centro y sur de Europa, Turquía y el Cáucaso. Ocupa laderas de montaña, con coníferas, sabinas y enebros, que intercalan claros y roquedos. En la península Ibérica nidifica por encima de los 1.700 m. en bosques subalpinos de los Pirineos, y en algún punto de la cordillera Cantábrica. Es migrante e invernante en las regiones mediterráneas, especialmente en el norte de África, aunque también en algunas zonas montañosas ibéricas, consumiendo entonces principalmente los gálbulos de sabinas y enebros.

En la provincia de Alicante, es principalmente un migrante escaso, observándose sobre todo en vertientes de umbría, con pinares y pinar/carrascal, junto a zonas abiertas, canchales o runares. En marzo pueden verse buenas concentraciones en la sierra de Aitana (zonas abiertas con abundantes rosales silvestres, junto al pinar que bordea los cortados de la umbría), y ejemplares más dispersos en casi todas las sierras de cierta entidad, incluso se ven a apenas 600-700 m. de altitud. Algún ejemplar podría permanecer invernando.

En el sur de Alicante, se observa un ejemplar junto al humedal del Clot de Galvany, el 13 de octubre de 2002. Aparte de esta observación, hay alguna otra, más antigua, en la sierra de Crevillente.

Apenas una cita de 1 ejemplar solitario en la isla, el 12 de marzo de 2002, probablemente un macho, que se ocultaba entre las paleras y orovales situados entre el faro y la Torre de San José. Al espantarse, se posó unos instantes en lo alto de un oroval, permitiendo disfrutar de la observación, volviendo a esconderse nuevamente.

Mirlo común *Turdus merula*

Merla

Migrante

Es un pájaro de buen tamaño (25 cm.), en el que los machos poseen un plumaje de color negro intenso, cola larga, y un llamativo pico amarillo-anaranjado. También tienen un discreto anillo ocular amarillo. Las hembras y jóvenes son de color pardo oscuro. Los machos emiten un canto bastante melodioso, y además tienen un reclamo de alarma sumamente escandaloso.

Vive en bosques, campos de cultivo arbolados, o con presencia de setos, parques y jardines, sotos de ríos, etc. Se alimenta de insectos, lombrices y frutos, deambulando por el suelo a saltitos, posándose a menudo muy erguido y con las alas ligeramente caidas, postura por cierto muy típica de mirlos y zorzales.

Se encuentra ampliamente extendido por toda Europa, salvo en las regiones más septentrionales, así como por el norte de África, Oriente Próximo y Turquía, hasta el mar Caspio. En la península Ibérica aparece homogéneamente repartido, así como en Baleares y Canarias. La población ibérica es sedentaria, aunque vienen a invernar aves europeas, y bajan mirlos de zonas montañosas a regiones más cálidas. En Alicante, se encuentra en toda la provincia, siendo un pájaro muy común, aunque es particularmente abundante en huertos de naranjos y limoneros.

En Tabarca, aparecen citas regulares tan solo durante la migración prenupcial, con registros de 1-2 ejemplares entre el 12 de marzo y el 22 de abril. Son aves con un comportamiento muy escondedizo, ocultándose muy bien en las zonas arbustivas más densas de paleras, imbricadas con orovales, o en setos arbustivos mixtos de orovales y cambroneras. Las observaciones son generalmente muy rápidas y fugaces, correspondiendo a aves solitarias y silenciosas, que no emiten ningún tipo de reclamo de alarma.

Mirlo común *Turdus merula. J. Pérez*

Zorzal común *Turdus philomelos*

Tord

Migrante e invernante

Zorzal ligeramente menor que un Mirlo (23 cm.), con partes sups. de color pardo oscuro, con el pecho y los flancos moteados de pardo oscuro, sobre un fondo ocre claro. No posee ceja ocular, y bajo el ala presenta una discreta tonalidad ocreamarillenta, visible en vuelo.

Se encuentra ampliamente extendido por toda Europa, con excepción de los paises del Mediterráneo, donde su presencia es más escasa e irregular. Es un pájaro de bosques, jardines y parques, setos y cultivos arbolados. Suele buscar su alimento en el suelo, basado en insectos, gusanos, caracoles y frutos. Inverna en la cuenca mediterránea, siendo muy abundante en olivares, o ecotonos de éstos u otros cultivos, con manchas de pinar, encinar o matorral mediterráneo.

En la península Ibérica tan solo es regular en las regiones más norteñas, especialmente en bosques caducifolios, penetrando de forma muy puntual y escasa hacia el sur, donde queda relegado a determinados enclaves montañosos. En la provincia de Alicante es un migrante e invernante común, pero no nidifica, aunque en algún trabajo se apunta la posibilidad de que pudiera nidificar de forma relicta u ocasional en la umbría de la Sierra de Salinas.

En la isla, es un pájaro escaso (del orden de 5-6 aves), pero regular, con observaciones invernales hasta finales de marzo. Todavía puede quedar, o pasar, algún ejemplar a principios de abril. Buen número de ejemplares (de 15-20 aves), evidentemente en paso, en la primera quincena de marzo. Tras el verano, reaparece a partir del 1-X, observando 3 individuos. Suele frecuentar las zonas de vegetación más densa, como son las formaciones mixtas de paleras y orovales que hay entre la Torre de San José y el Faro, y entre éste y el Cementerio. Asimismo, algunos setos marginales a estas zonas, bien de palera/oroval o de oroval y cambronera. Menos a menudo, puede esconderse algún ejemplar en algún arbusto situado fuera de estas zonas, o en el pueblo, en jardines de algunas casas, o en el pequeño palmeral junto a la Iglesia. Lo normal es que a nuestro paso, salga volando tras emitir alguna nota de reclamo, buscando refugio más allá; sin embargo no es raro verle desplazándose por el suelo, buscando su sustento, en los espacios que quedan entre las filas de paleras y orovales.

SYLVIIDAE

Esta familia incluye carriceros, currucas y mosquiteros, con algunas especies muy parecidas. Son pájaros de pequeño tamaño, muy inquietos, de alas cortas y redondeadas. Cola larga en las currucas. Los sexos son generalmente parecidos (salvo las currucas), con plumajes habitualmente pardos, grises, verdes y amarillos, o una mezcla de éstos. Poseen picos finos, "de insectívoro", alimentándose de insectos y otros invertebrados que capturan entre el follaje de los árboles, arbustos o vegetación palustre. Son pájaros que cantan muy bien, lo cual además favorece su detección e identificación. La mayoría de especies europeas son migradoras nocturnas.

Curruca carrasqueña *Sylvia cantillans*. *S. Arroyo*

Buscarla pintoja *Locustella naevia*

Boscarler pintat

Migrante

Pajarillo de 13 cm. de longitud, de color pardo-oliva, con listado oscuro. También presenta listas en obispillo, y a veces en pecho y flancos. Mínima lista superciliar. Cola redondeada. Posee un canto monótono, en forma de un zumbido continuo. En general, habita en la vegetación palustre de humedales y zonas pantanosas, aunque también puede nidificar en zonas de matorral, herbazales y prados húmedos, así como en borde de bosque. Es un pájaro muy escondedizo, que le cuesta levantar el vuelo, prefiriendo corretear entre la vegetación, cual si fuese un inquieto ratoncillo

Está ampliamente distribuida por los paises del centro y norte de Europa, y ausente de la cuenca mediterránea y las regiones más norteñas de Fenoescandia. En la península Ibérica, tan solo se reproduce en la costa cantábrica

.

En Tabarca se registran al menos 5-6 ejemplares en paso postnupcial, el 5 de mayo de 2001. Como ya hemos comentado anteriormente, este día 5 de mayo fue excepcional, observando primero un ejemplar perfectamente, y a simple vista, en la zona más densa de paleras y orovales, entre la Torre de San José y el Faro (¡al mirarnos, a poco más de 1 m. de distancia, no sabría decir quién se quedó más sorprendido y petrificado, si la buscarla o el observador!). Más tarde, en una zona de bajos, raquíticos y medio secos cambrones, y suaedas (no más de 40-50 cm. de altura), situados inmediatamente detrás del Cementerio, se vuelven a observar varios ejemplares que correteaban por el suelo en el interior de los cambrones, pasando de unos matorrales a otros, observándolos desde encima. Aunque la observación a través del matorral fue inmediata, al final conseguimos que alguno levantara el vuelo, y además tuvimos la suerte de que debió despistarse, pues fue a posarse en la pared del acantilado adyacente, al descubierto, pudiendo observarle a placer con el catalejo durante un buen rato, y a escasa distancia. Durante la migración postnupcial, igualmente, tan solo tenemos el registro de un ave, asimismo increiblemente escondediza, que se ocultaba también en cambrones y suaedas más dispersos de la cara norte de la isla.

Buscarla unicolor *Locustella luscinioides*

Boscarler comú

Migrante

Es un pájaro de 14 cm., de color pardorojizo uniforme, aunque algo más pálido en las partes infs., con una tenue lista superciliar, garganta blanca, y cola ancha y redondeada. Su canto es un monótono zumbido, emitido desde lo alto de los carrizos u otro tipo de vegetación palustre, en humedales, zonas pantanosas y otros hábitats acuáticos, que es donde desarrolla su ciclo vital esta especie.

Se distribuye por Europa central, con presencia escasa y localizada en algunas localidades del Mediterráneo. En la península Ibérica es una especie escasa, localizada en determinados humedales, principalmente de las costas mediterránea y atlántica, aunque también aparece en algunos puntos del interior.

En Alicante, nidifica en extensas formaciones palustres de algunos humedales costeros: El Hondo, las Salinas de Santa Pola (aunque en éstos, en la actualidad, podría incluso haber desaparecido como nidificante), y la marjal de Pego-Oliva (otro humedal agredido y degradado estos últimos años). La especie es un migrante transahariano, habiendo citas de escasos ejemplares durante los pasos migratorios, capturados en las campañas de anillamiento científico realizadas en diferentes aguazales.

En Tabarca únicamente tenemos 2 registros, durante la migración prenupcial. Una de las observaciones corresponde al día 5 de mayo de 2001, increible día, como comentamos anteriormente, en que se vió gran cantidad y diversidad de paseriformes migrantes, sedimentados por las adversas condiciones meteorológicas de la noche anterior. Este ejemplar se observa al descubierto, al borde del acantilado de la isla, detrás del Cementerio (la verdad es que en esta zona vimos 3 especies de pajarillos que normalmente no suelen verse con los prismáticos), al abrigo del viento moderado del suroeste, aunque también se escondía en algunos pequeños matorrales halófilos del borde del acantilado. Nuevamente, durante la primavera siguiente, se observan 2 ejemplares el 3 de abril de 2002, en una zona de orovales entre el Faro y el Cementerio, pero estas aves eran sumamente escondedizas y reacias a abandonar su escondrijo.

Carricerín común *Acrocephalus schoenobaenus*

Xitxarra dels joncs

Migrante

Pequeño pájaro de 13 cm., de color pardo claro, con listas más oscuras en el dorso, y partes inferiores más pálidas. Ceja blanco-cremosa, y obispillo pardo-rojizo. Habita en carrizales y diversa vegetación palustre de humedales y otros medios acuáticos.

Se encuentra ampliamente repartido por toda Europa, aunque falta en la mayor parte de la cuenca mediterránea. En la península Ibérica aparece como reproductor, de forma muy puntual, en localidades costeras del Cantábrico. Es un migrante transahariano, cuyos contingentes migrantes pasan durante la migración postnupcial principalmente por las regiones más occidentales de la Península, mientras que el paso prenupcial está más próximo a la vertiente mediterránea.

En Tabarca, tan solo dos observaciones: un ejemplar el 5 de mayo de 2001, en el extremo noreste de la isla, junto a Punta Falcó. Este carricerín nos tuvo entretenidos un buen rato, pues se escondía en pequeños matorrales (menos de 20 cm. de alzada) del borde del acantilado costero, y prácticamente no salía de éstos ni estando completamente pegados a ellos.

Además, cuando cambiaba de escondite y se volvía a esconder en otro matorralillo, no daba tiempo suficiente a identificar correctamente. Menos mal que, ya cansados ambos –pájaro y observadores- de jugar "al gato y al ratón", dudó una de las ocasiones un par de segundos para ocultarse, permitiendo observarle bien. De todos modos, un rato antes, llegando al cementerio, situado a escasos metros de Punta Falcó, se observó otro carricerín sp., por lo que tal vez pudiese haber habido algún ejemplar más. Este día 5 de mayo de 2001 fue probablemente el más espectacular de los pasados en Tabarca (en cuanto a pajarillos), y fue un magnífico día soleado, tras una tarde-noche tormentosa, que evidentemente forzó a buen número de paseriformes a buscar cobijo en la isla. De hecho, este pájaro prácticamente solo se observa cuando es capturado en las redes que se colocan en los humedales, en las campañas de anillamiento científico, durante los movimientos migratorios. La segunda observación se realiza el 17 de abril de 2003 en unos arbustos del Campo.

Zarcero pálido *Hippolais pallida*

Bosqueta pàl.lida

Migrante

Este sílvido de 13 cm. de longitud, presenta un plumaje en el dorso de color gris verdoso uniformemente apagado, y las partes inferiores con tonos que varían del blanco al crema. Cría en sotos, carrizales, olivares o cultivos de cítricos.

Esta especie del Paleártico occidental, presenta dos zonas de distribución separadas entre sí, la occidental, que se extiende por el tercio sur peninsular y el norte de África, entre Túnez y Marruecos, y la oriental, desde los Balcanes al Cáucaso. La invernada la realiza en las secas sabanas situadas al sur del Sáhara. En el sur de Alicante, pese a tener hábitats propicios, no se ha constatado su reproducción, atribuyéndosele un estatus de migrante escaso, ya que se registran unas pocas citas cada año, durante la primavera y al final del verano.

Durante el periodo de realización del estudio, tan solo hemos registrado una cita, de 2 aves, el 1 de octubre de 2001, en un oroval entre el Faro y el Cementerio. Hay algunas otras citas de años anteriores, de Malcom Palmer, correspondientes al paso prenupcial, entre el 18 de abril y el 21 de mayo.

Zarcero común *Hippolais polyglotta*

Bosqueta vulgar

Migrante

El Zarcero común mide 12,5 cm. de longitud, el plumaje de las partes superiores es verde pardusco, y las inferiores de tonos amarillos de intensidad variable. Por su aspecto y el color de su librea, recuerda a una especie a medio camino entre los carriceros y los mosquiteros. Al igual que el resto de integrantes de la familia Silvidae, basa su alimentación en

Su área de distribución primaveral se ciñe al sector sudoccidental del Paleártico occidental: parte del noroeste africano, península Ibérica, Francia e Italia. La invernada la realiza en el África subsahariana.

En el sur de Alicante es común encontrarle cerca de cuerpos de agua, con vegetación densa de tarajes y carrizos (las mejores densidades de esta especie, dentro de su escasez, se encuentran alrededor del embalse de La Pedrera); también en cultivos arbolados, a menudo cítricos, granados o huertos de palmeras. En cualquiera de estos lugares podemos escuchar el melodioso canto de los machos (muy parecido al de las currucas), que realizan desde algún lugar prominente de la vegetación.

Es un migrante primaveral tardío, apareciendo generalmente durante el mes de mayo. En Tabarca ha sido registrado entre los días 7 y 21 de mayo, en 2001. El día 14 de mayo de 2001, fue probablemente el segundo paseriforme más frecuente, solo por detrás del Papamoscas gris. En la primavera de 2002, realizamos la primera observación el 22 de abril. Durante el paso postnupcial, se producen observaciones entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre de 2001. Se le observa normalmente moviéndose entre la vegetación de mayor porte del Campo de la isla, principalmente por las paleras, así como en los orovales y otros arbustos dispersos.

Curruca rabilarga *Sylvia undata*

Busquereta cuallarga

Migrante e invernante

Es una curruca bien distribuida por el Mediterráneo occidental, ocupando la península Ibérica (en Baleares, solo aparece en Menorca), parte de Francia, llegando al sur de Gran Bretaña, mitad sur de Italia, así como las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, y norte de África. Es una especie que realiza desplazamientos invernales a sectores más cálidos, alcanzando el norte de África. Su hábitat característico son diferentes tipos de matorrales de bajo porte (jarales, maquia mediterránea, espinares, romerales, saladares,etc). Es una curruca de 13 cm., de tonos oscuros, cuerpo pequeño y cola muy larga, que suele mantener levantada, especialmente si está "nerviosa".

La cabeza y partes sups. son de color gris oscuro, y las inferiores son de color rojo-granate, de aspecto "vinoso". Llamativo anillo ocular rojizo, y patas anaranjadas. Sexos semejantes, con hembras algo más apagadas. Canto típico de curruca, con un reclamo ("téc") muy característico e inconfundible, casi más seguro que el canto.

En la provincia de Alicante es un pájaro común, como nidificante, en diversos tipos de matorral de zonas montañosas (principalmente en laderas de solana, aunque también en umbrías), ocupando romerales, jarales, matorral mediterráneo no muy alto y espeso, pinares jóvenes con sotobosque de romeral o coscojas, así como en carrascales de porte arbustivo en zonas de cumbre.

No aparece en saladares (aunque sí se presenta en ellos durante la invernada). En las zonas costeras del sur de Alicante no aparece en periodo reproductor, comenzando a verse algunas parejas nidificantes a partir de las laderas de solana de las Sierras de Crevillente y Albatera, y probablemente también en las sierras de Escalona y Orihuela. Sin embargo, es un pájaro común e incluso abundante durante la invernada, empezando a verse ya algún ejemplar a final de julio/principios de agosto, precisamente en los saladares periféricos a los humedales.

En Tabarca, unos pocos ejemplares utilizan durante el invierno los matorrales del Campo, generalmente los situados de manera dispersa entre los herbazales, escondiéndose sobre todo en los cambrones (Lycium intrincatum), aunque ocasionalmente puede introducirse en los sectores de paleras y orovales más densos. Algún año pueden ser especialmente abundantes: Así, Malcom Palmer en diciembre de 1994 estima su presencia en unas 50 aves. Es un pájaro insectívoro, que consume insectos y sus larvas, arañas y gusanos, consumiendo también los rojos frutos del Cambrón. La especie desaparece en la primera quincena de marzo (de todos modos, excepcionalmente puede quedar algún rezagado hasta mediados de abril), para desplazarse hasta sus áreas de reproducción. Las primeras aves son nuevamente observadas, tras su ausencia estival, a partir de principios de octubre (1ª observación el 1 de octubre), detectándose un discreto paso, que ocasionalmente puede verse muy aumentado. En este sentido, Malcom Palmer, en 1994, observa una importante presencia de rabilargas el 17 de octubre, con una valoración aproximada de 60 ejemplares.

Curruca tomillera *Sylvia conspicillata*

Busquereta trencamates

Migrante

Pequeña curruca de 12 cm. de longitud, con cierto parecido a la Curruca zarcera (aunque la Tomillera es más pequeña y no tan robusta, y presenta las alas de un pardorojizo más intenso). Las tomilleras poseen las alas de un color pardorojizo intenso, luciendo los machos, en una cabeza grisácea, negro alrededor y delante del ojo. Las hembras, sin embargo, poseen la cabeza pardo grisácea, sin negro. Ambos poseen anillo ocular blanco y el iris naranja claro. Las zonas inferiores son pardo-rosadas. Patas de color naranja. Tiene un canto típico de curruca, que emiten los machos tanto desde algún posadero como en vuelo.

Es una curruca típica del Mediterráneo occidental, distribuyéndose por la península Ibérica, Baleares y Canarias, sur de Francia e Italia, y sus grandes islas, así como el norte de África y Oriente Próximo. En Iberia está ampliamente repartida, pero es más abundante en Cataluña, Levante y Andalucía, así como Madrid, Castilla y León y el valle del Ebro. En otras regiones aparece más puntualmente. Es un migrante transahariano, aunque cierto número de aves permanecerían en Andalucía y Murcia, comportándose aquí como sedentarias.

Página siguiente: Curruca tomillera *Sylvia conspicillata*. *S. Arroyo*

El hábitat que ocupa es un matorral bajo y abierto, en general en zonas bien soleadas o vertientes de solana. En el sur de Alicante nidifica principalmente en los saladares de baja altura, y otras plantas halófilas, adyacentes a los humedales, así como eriales con vegetación nitrófila de sustitución de los cultivos abandonados que rodean el embalse de la Pedrera. En el resto de la provincia de Alicante ocupa también romerales, espartales, tomillares y jarales, así como la vegetación surgente tras incendios, llegando hasta los 1.000 m. de altitud.

En la isla de Tabarca, tan solo algunas contadas observaciones durante el paso primaveral, entre el 31 de marzo y el 24 de abril de 2001 (En 2002, primera cita el 26 de marzo). Malcom Palmer, sin embargo, en 1993, estima el 18 de abril su presencia en al menos 20 aves. En general, ocupa los matorrales de cambroneras y orovales dispersos entre los herbazales del Campo, evitando las formaciones más densas de paleras y orovales.

Curruca carrasqueña *Sylvia cantillans*

Busquereta de garriga

Migrante

Curruca de tamaño pequeño (12 cm.). Los machos son más contrastados que las hembras, presentando gris oscuro en las zonas superiores, con la garganta, el pecho y los flancos rojoanaranjados, así como una bigotera blanca muy conspicua. Anillo ocular rojizo. Hembras con dorso grispardusco, y en general de tonos más discretos. Podríamos llegar a confundirnos con la curruca rabilarga, si la observación es fugaz (la Rabilarga tiene la cola más larga y no posee bigoteras).

Es una especie de distribución perimediterránea, ocupando el norte de Marruecos, Argelia y Túnez, así como la península Ibérica, Francia, Italia, e islas, y península Balcánica, hasta Turquía. Se encuentra bien repartida por toda la península Ibérica, con ausencia en la franja más norteña y Galicia, así como en amplias zonas sin hábitat apropiado. Es puntual en Baleares, y ausente en Canarias, pudiendo subir hasta los 1.900 m. de altitud en Sª Nevada. Es un migrante transahariano, que permanece entre nosotros durante el periodo estival.

En Alicante aparece principalmente en el interior y la mitad norte, generalmente en zonas montañosas, a menudo en vertientes de umbría, que es donde principalmente aparece su hábitat idóneo: carrascales, formaciones mixtas de carrascas y pinar, o pinar con abundante sotobosque. De todos modos, no es una especie abundante.

En Tabarca, es algo más frecuente que la Curruca tomillera, con citas de paso primaveral bastante amplio (entre el 17 de marzo y el 14 de mayo), y postnupcial breve (entre el 17 de septiembre y el 3 de octubre). Frecuenta zonas de matorral y arbustos densos, como las formaciones mixtas de paleras y orovales, así como matorrales dispersos en el Campo. Durante sus paradas en la Isla, consume tanto insectos como frutillos de la cambronera.

Curruca cabecinegra *Sylvia melanocephala*. *J. Pérez*

Curruca cabecinegra *Sylvia melanocephala*

Busquereta capnegra

Residente

Curruca de 13 cm., con un claro dimorfismo sexual, y aunque ambos sexos son de un color general grisáceo, los machos presentan la cabeza de color negro intenso. Poseen un anillo ocular rojo, bien apreciable. Las zonas inferiores son gris claro y la garganta blanca. Canto típico de curruca, que emite tanto desde posaderos como en vuelo, incluso varios metros por encima de la vegetación.

Habita los paises de la cuenca mediterránea. En la península Ibérica tan solo falta en algunas zonas del norte, ocupando también Baleares y Canarias. Es sedentaria, aunque podría realizar pequeños movimientos dispersivos.

El medio que ocupa es bastante amplio, aunque es más abundante en la maquia mediterránea (coscojas, lentiscos, etc.), aunque también en pinares con monte bajo, diferentes cultivos arbolados, jardines, y saladares de buena altura.

En Alicante es la curruca más común y extendida, siendo en las comarcas costeras del sur especialmente abundante en pequeños retazos de matorral mediterráneo que quedan en vaguadas y barrancos de nuestras pequeñas sierras, así como en saladares bien desarrollados. También en pinares, incluidas las zonas dunares, especialmente en el primer frente de pinos próximos al mar, con porte de chaparral, por estar azotados por los vientos marinos y el movimiento de la arena.

En Tabarca es una especie sedentaria, siendo habitual durante todo el año, principalmente en zonas con densos matorrales y arbustos (sectores mixtos de paleras y orovales), y también, aunque menos, en matorrales dispersos por el Campo. Generalmente suelen verse ejemplares machos, que se muestran sin mucho recato, especialmente en periodo reproductor, cantando y dejándose ver con suma facilidad, así como realizando vuelos nupciales a cierta altura sobre los arbustos. En la isla nidifican al menos 6-7 parejas, que comienzan la reproducción de forma muy temprana; así, observamos a los dos miembros de una pareja entrando a cebar al interior de un oroval (señal inequívoca de presencia de pollos en el nido) el 18 de marzo de 2002. En mayo de 2001 encontramos un nido abandonado, con tres huevos, uno de ellos agujereado, también en un oroval. Los machos cantan especialmente durante la primavera, hasta finales de mayo, entrando a partir de estas fechas en una aparente ausencia debido a las altas temperaturas de la parte central del día, haciéndose algo más presentes al amanecer y atardecer. Terminado el largo y tórrido verano isleño, las cabecinegras vuelven a hacerse muy conspicuas a partir del mes de octubre, y ya todo el invierno y primavera. De todos modos, no se descarta que en esta "ausencia" estén implicadas algunas aves, especialmente los jóvenes del año, que realicen desplazamientos de corto alcance hasta la costa peninsular más próxima. En 2005 la especie desaparece como nidificante, probablemente por el crudo invierno anterior y/o la sequía que padecemos. Sin embargo vuelve a recuperarse en 2006.

**La Curruca cabecinegra no aparece como nidificante en el AANCV (datos de campo de 1987)*

Curruca mirlona *Sylvia hortensis*

Busquereta enmascarada

Migrante

Curruca de buen tamaño (15 cm.), con la cabeza muy oscura, prácticamente negra, donde destaca mucho el iris blanco o claro (¡posible confusión con la Curruca cabecinegra, muy común, pero la cabecinegra es más pequeña, menos robusta, y posee un anillo ocular rojo!). Las partes superiores son de un pardogrisáceo oscuro, las inferiores de un rosa pálido, y la garganta blanca. Las plumas externas de la cola son blancas. Tiene un pico más grande y robusto que otras currucas, y las patas negras. La hembra posee un plumaje más tenue, especialmente en la cabeza.

Posee un canto típico, muy diferente del resto de las currucas, con notas que recuerdan el canto de un mirlo; sin embargo, es fácil de reconocer y diferenciar incluso a buena distancia.

Se distribuye por los paises de la cuenca del Mediterráneo, llegando por Turquía hasta el mar Caspio. En la península Ibérica presenta como nidificante una distribución amplia, pero irregular, siendo más común en el sur y este (Andalucía, Levante y Cataluña), Meseta Norte y Valle del Ebro. No aparece en Baleares ni Canarias. Es un migrante transahariano.
Es una curruca más arbórea que el resto de currucas, y típica de borde de bosque, frecuentando carrascales, encinares, pinares, sabinares y cultivos arbóreos de secano, habitualmente en zonas termófilas y bien soleadas, pudiendo subir en altitud hasta los 1.500 m.

En Alicante es una especie reproductora escasa, estando presente en las comarcas del interior, a alturas medias, generalmente en el piedemonte o zonas llanas, ocupando más comúnmente bordes de pinar, habitualmente lindantes o próximos a cultivos de secano (almendros y olivos), aunque también penetra en carrascales y maquia mediterránea. Como migrante es particularmente rara.

En la isla de Tabarca, apenas tenemos un par de observaciones durante el periodo de estudio, realizadas en días consecutivos, en mayo de 2002. Así, se observa un ejemplar, posado en lo alto de un oroval del Campo de la isla, entre el Faro y el Cementerio, el 10 de mayo de 2002, y otro al día siguiente, 11 de mayo, en la zona oeste, posándose unos instantes en la antena de televisión de la primera casa del pueblo, y posteriormente ocultándose en el pequeño jardín de otra casa próxima, donde se perdió de vista, en compañía de varias currucas mosquiteras. Aparte de estas observaciones, solo una observación antigua de 1 ex., observado por Malcom Palmer el 28 de marzo de 1993, por cierto, muy temprana.

Curruca zarcera *Sylvia communis*

Busquereta vulgar

Migrante

Mide unos 14 cm., y el cuerpo es de color pardo claro, con alas pardorojizas y garganta blanca, a menudo "inflada". El macho tiene la cabeza gris claro y la hembra pardusca, como el resto del cuerpo. Posee un anillo ocular blanco, y el iris es naranja claro. Posee una cola larga, con las plumas externas blancas. Canto típico de curruca, pudiendo cantar desde posadero, o sobrevolando la zona, en especial para atraer los machos la atención sobre ellos.

Curruca ampliamente distribuida por todo el continente europeo, con excepción de las regiones más norteñas de Fenoescandia. En España, ocupa principalmente la mitad norte y este, siendo en el sur más irregular y localizada, y en general acantonada en vertientes montañosas de umbría. Es un migrante subsahariano.

En la provincia de Alicante es escasa, presentándose de forma dispersa en zonas montañosas de la mitad norte, en sectores de matorral mediterráneo o borde de pinar o pinar/carrascal, con presencia de arbustos de sustitución dispersos (rosal silvestre, espino

En el sur de Alicante es un pájaro de paso, aunque podría haber nidificado alrededor del embalse de la Pedrera, como señalan algunas publicaciones, sin embargo en la actualidad no nidifica.

En Tabarca es la curruca migrante más común y abundante, presentándose principalmente durante el paso prenupcial, que se produce entre el 17 de marzo y el 21 de mayo. Se escucha algún macho emitiendo canto flojo a mediados de mayo. En concreto, el día más intenso de paso fue el 5 de mayo de 2001, con un mínimo (siendo discretos) de 40-50 aves sedimentadas (el paseriforme más abundante este día), que debió estar favorecido por las lluvias que se produjeron por la tarde-noche precedentes. Prácticamente se la observa en cualquier zona con cierta cobertura vegetal, especialmente en las zonas de vegetación más densa (zonas mixtas de paleras/orovales), así como orovales y cambroneras dispersas por el Campo, y pequeños jardines de algunas casas del pueblo, y en grupo de palmeras junto a la Iglesia. Durante la migración postnupcial, muy poco aparente, apenas se recoge una observación de 2 ejemplares el 17 de septiembre, y un ave el 25 de septiembre. En la primavera de 2002, destacan los día 10 y 11 de mayo, con no menos de 15 ejemplares (temporal de lluvia y viento de levante los días previos).

Curruca zarcera *Sylvia communis*. *S. Arroyo*

Curruca mosquitera *Sylvia borin*

Busquereta mosquitera

Migrante

Curruca regordeta, de 14 cm. de longitud, que no presenta dimorfismo sexual, con un plumaje muy discreto y poco llamativo, de color pardo, destacando apenas unas bandas laterocervicales gris claro. El pico es corto y grueso. Está ampliamente distribuida por toda Europa, aunque falta en bastantes regiones perimediterráneas. Habita en bosques caducifolios abiertos, arbustos, setos y borde de bosques, con malezas arbustivas de sustitución (zarzas, espinos, etc.), así como en sotos. En España se reparte más o menos homogéneamente por la mitad norte, mientras que en el sur aparece de forma muy local. Es un migrante transahariano, insectívoro en primavera-verano, y frugívoro en paso e invernada, como ocurre con algunas otras currucas. En la provincia de Alicante, podría nidificar ocasionalmente, y de forma muy puntual, en áreas montañosas del norte, en zonas de umbría.

Es un pájaro bastante escaso en la isla, tratándose principalmente de un migrante primaveral, con observaciones en el año 2001, entre el 5 y el 21 de mayo, con cifras máximas de 5 ejemplares el 5 de mayo, que igualmente que con las zarceras, debió favorecer la lluvia de la noche anterior. En el año 2002, paso prenupcial a partir del 13 de abril, con máximo de 12-15 aves el 11 de mayo (los días previos se caracterizaron por un fuerte temporal de lluvia e importantes marejadas de levante). El paso otoñal es realmente anecdótico. Así, durante el año 2001, tan solo se registra un ave el 2 de octubre. En este sentido, de mínima presencia postnupcial, añadir el registro de Malcom Palmer, de un ex. el 16 de septiembre de 1999. Es bastante escondediza, ocultándose en las formaciones arbustivas más densas del Campo, así como en los pequeños jardines con árboles y otras plantas ornamentales, que poseen algunas casas del pueblo.

Curruca capirotada *Sylvia atricapilla*

Busquereta de casquet

Migrante e invernante

Curruca de 14 cm. de longitud, de color pardogrisáceo (más pálido en partes infs.), poseyendo los machos una “boina”negra, que en las hembras es de color marrón. Tiene un canto más melodioso que la mayoría de las currucas. Es una curruca bastante forestal, habitando en bosques y zonas arbustivas, con claros, setos y linderos, así como en cultivos arbolados, parques y jardines.

Posee una amplia distribución europea, faltando solo en las regiones más norteñas de Fenoescandia. También nidifica en el norte de África. Es un invernante común en los países mediterráneos, con una fracción de aves que atraviesan el Sáhara. En España aparece de forma homogénea en el tercio norte, rarificándose hacia el sur, limitando su presencia a zonas montañosas y bosques de ribera. Presente en Baleares y Canarias. Además de la población nidificante, es un invernante común y abundante, produciéndose también movimientos altitudinales desde sectores montanos hacia zonas más cálidas.

En Alicante, es un nidificante escaso en comarcas del interior y del norte de la provincia, ligada a los enclaves más húmedos: umbrías de montaña, con carrascales o bosques mixtos de carrasca/pinar, y sotos de ríos. Además, es un invernante común, frecuentando manchas de pinar con sotobosque, matorral mediterráneo de lentiscos y coscojas, zonas ajardinadas, olivares y huertos de cítricos, siendo particularmente abundante en los palmerales con dátiles maduros.

Además de la Curruca cabecinegra, que permanece en la isla todo el año, la Capirotada, junto con la Rabilarga, son las dos únicas currucas invernantes. De todos modos, apenas invernan unos pocos ejemplares. La migración prenupcial se produce principalmente a lo largo del mes de marzo, momento en que son muy escondedizas, ocultándose principalmente en las densas formaciones de paleras y orovales situadas entre el Castillo y el Faro, sin embargo se las detecta bien, porque los machos emiten un canto débil, pero perfectamente identificable. Todavía se registran algunos migrantes hasta principios de mayo. Tras la ausencia veraniega, reaparecen a partir de principios de octubre, dilatándose ya su presencia durante el otoño y el invierno. A finales de octubre hemos sorprendido algún ejemplar comiendo dátiles en un pequeño grupo de palmeras junto a la Iglesia, en compañía de numerosos gorriones que también daban buena cuenta de los suculentos frutos de la palmera. Es una curruca con un régimen alimenticio mixto,insectívoro sobre todo en primavera y verano, y frugívoro durante su estancia otoñoinvernal en nuestras latitudes, siendo especialmente abundante en olivares y palmerales (consumiendo olivas y dátiles), donde puede alcanzar altas densidades.

Mosquitero silbador *Phylloscopus sibilatrix*
Mosquiter xiulaire
Migrante

El Mosquitero silbador tiene un aspecto rechoncho, y posee un buen tamaño (12,5 cm.), en comparación con otros mosquiteros. El pecho ancho y las largas infracobertoras caudales, le hacen parecer un poco colicorto cuando se le observa desde abajo. La ceja, la garganta y el pecho amarillo limón, contrastado con el blanco limpio del vientre, unido a su mayor tamaño le diferencian del resto de mosquiteros. El pico y las patas son de color rosáceo. No hay diferencia de sexo y edad en el plumaje; tán solo durante el otoño es posible distiguir a los adultos por tener éste desgastado.

Cría desde el centro y norte de Europa hasta Siberia occidental, en bosques latifolios o mixtos, con árboles de buen tamaño y escaso sotobosque, frecuentando esta especie forestal los estratos más altos de la bóveda arbórea. En España hay escasas citas de reproducción en zonas montañosas del norte de la península Ibérica, mientras que en el resto se le puede observar durante los pasos migratorios. Inverna en el África ecuatorial.
En Tabarca, solo se ha registrado una observación, de un ejemplar, el 25 de septiembre de 2001, en el grupo de palmeras que hay junto a la Iglesia.

Mosquitero común *Phylloscopus collybita*
Mosquiter comú
Migrante e invernante

El Mosquitero común presenta un plumaje de color pardo verdusco en el dorso y blanquecino por abajo, con tonos amarillentos en la garganta y el pecho. A menudo, se pueden observar ejemplares que difieren en buena medida entre sí por la intensidad de los colores del plumaje, circunstancia ésta achacable a la existencia de varias subespecies y su intergradación, además de la decoloración producida por el desgaste del plumaje. Normalmente es de carácter confiado, pudiendo ser observado a poca distancia, moviéndose nerviosamente entre los arbustos mientras se alimenta de pequeños insectos, chasqueando las alas a la vez que sube y baja la cola.

Cría desde Europa occidental hasta Siberia. Las poblaciones del este y norte de Europa son migradoras al Mediterráneo y norte de África. En el sur de las islas Británicas, Francia, Italia y norte de la península Ibérica reside todo el año, siendo la única especie de mosquitero invernante en Europa.

Es extraordinariamente común en el sur de Alicante durante todo el invierno, frecuentando prácticamente todo tipo de ambientes con un mínimo de cobertura vegetal, donde pueda encontrar los pequeños insectos de los que se alimenta. Sin embargo, donde es particularmente abundante es en los extensos carrizales de nuestros humedales, siendo la especie más abundante en ellos durante el invierno.

Mosquitero común *Phylloscopus collybita. A.J. Ramos*

En Tabarca es constante su presencia durante todo el otoño e invierno, siendo una especie habitual durante esos meses. En el campo de la isla le gusta frecuentar los orovales, que en esa época del año disponen de un denso follaje, así como chumberas o cambroneras. El punto álgido del paso primaveral se ha detectado entre final de abril y principios de mayo. Las últimas observaciones se han realizado el 7 de mayo, reapareciendo nuevamente a partir del 17 de septiembre.

Mosquitero musical *Phylloscopus trochilus*
Mosquiter de passa
Migrante

Especie muy similar al Mosquitero común, es ligeramente mayor (11,5 cm) y más estilizado, de patas finas y pico delicado. El color del plumaje suele ser más limpio e intenso, con patas y pico de tonos claros, aunque lo que determina con más exactitud la diferencia con éste, es su distintivo canto, que se compone de una serie de notas ("sui") delicadas y melancólicas, que aumentan poco a poco en intensidad, acabando en un melodioso gorjeo.

Su zona de reproducción se distribuye a lo largo de todo el área templada y boreal del Paleártico, desde las islas Británicas al estrecho de Bering. En la franja más septentrional de la península Ibérica cría un reducido número de parejas. El grueso de la especie cruza nuestro país por su mitad occidental; no obstante es uno de los migrantes transaharianos más frecuentes de las costas mediterráneas ibéricas. La mayor parte de ellos proceden fundamentalmente de Europa occidental, y en menor medida de los paises nórdicos. Inverna en África tropical, por debajo de los 10º de latitud norte, aunque se han recuperado individuos en la Península durante los meses invernales. Cría en umbríos bosques caducifolios provistos de sotobosque, aunque durante la migración se le observa en una gran diversidad de ambientes.

En Tabarca, es una especie habitual durante las migraciones, pululando por los arbustos de mayor porte de la isla, frecuentemente en compañía de mosquiteros comunes. Se le ha observado durante la migración primaveral, entre el 17 de marzo y 21 de mayo, con máximos a finales de abril/principios de mayo; después, durante el paso postnupcial, entre el 29 de agosto y 2 de octubre, con máximos a mediados de septiembre. El paso prenupcial es sensiblemente más escaso que el postnupcial.

Mosquitero papialbo *Philloscopus bonelli*
Mosquiter pál.lid
Migrante

Pequeño mosquitero de 11 cm. de longitud, de color verdegrisáceo pálido en partes superiores y blanca en las inferiores, con tonos amarillentos en las alas, obispillo y plumas externas de la cola. Patas de color pardo. El Papialbo es una especie forestal termófila, más abundante en el piso supramediterráneo, ocupando robledales (melojares, quejigales), encinares y coníferas (sabinares y pinares), rarificándose hacia pisos más cálidos.

Se distribuye como reproductor por los paises del centro, oeste y sur de Europa, así como en el norte de África. En la península Ibérica se encuentra bien repartido, aunque es bastante escaso en Galicia y fachada cantábrica, así como en amplias zonas de la meseta sur. Ausente en las islas Baleares y Canarias. Es una especie estival, que pasa el invierno en África subsahariana.

En la provincia de Alicante, aparece como nidificante en la zona noroeste, generalmente por encima de los 600 metros de altitud, ocupando principalmente exposiciones de umbría, en pinares, carrascales o formaciones mixtas de pinos y carrascas. En el sur de Alicante, es un migrante raro o escaso, con algunas observaciones durante los pasos migratorios en pinares dunares, de la sierra de Santa Pola, y eucaliptos en el Hondo.
En Tabarca, apenas hemos observado un ejemplar el 29 de abril de 2003, moviéndose por grandes arbustos de oroval y cambrón junto al Faro.

Reyezuelo listado *Regulus ignicapillus*
Reiet safraner
Migrante

Es uno de los pájaros más pequeños del continente europeo, con apenas 9 cm. de longitud. Presenta las partes superiores verdeamarillentas, con las alas oscuras, donde se evidencia una doble banda alar blanca. En el diseño cefálico, muy característico, luce una lista ocular negra sobre la que destaca una amplia ceja blanca. El capirote es amarilloanaranjado, enmarcado en negro. Partes inferiores blanco sucio.

Se distribuye por toda Europa, faltando de Escandinavia, y solo aparece al sur de Gran Bretaña. También se le encuentra en las grandes islas de Mediterráneo, norte de África y Turquía. En la península Ibérica se distribuye más o menos uniformemente por la franja norteña, Cataluña y País Valenciano. Igualmente, aparece en zonas montañosas del centro y sur peninsular. Hay aves sedentarias, con entrada de migrantes europeos, así como aves montanas que bajan de altitud durante el invierno.

Es un pajarillo insectívoro, que nidifica de forma escasa en la provincia de Alicante, en pinares silvestres, carrascales y formaciones mixtas de carrascal y pinar, situados en laderas de umbría de las montañas del norte. Durante el invierno se incrementa su presencia por la llegada de aves migrantes europeas, pudiendo entonces observarle en las manchas de pinar que quedan en el sur de Alicante, principalmente en la sierra de Santa Pola y lomas del Carabassí, así como en la pinada dunar de La Marina y Guardamar. Este pajarillo rebuye inquieto entre el follaje de los árboles, generalmente a buena altura, dificultando disfrutar de su observación, y detectando su presencia por el leve reclamo que emiten: un "si-si-si-si", repetido.

En la isla, tan solo dos observaciones durante la migración prenupcial. Así, durante el periodo de estudio, nos quedamos sorprendidos al observar un ejemplar el 17 de marzo de 2001, en la zona principal de paleras y orovales, moviéndose sin cesar en busca de insectos entre los orovales de mayor porte. Además, hay otro registro antiguo de Malcom Palmer, correspondiente a un ejemplar el 22 de abril de 1994.

MUSCICAPIDAE

Aves insectívoras pequeñas, que se alimentan de insectos voladores que atrapan con un rápido vuelo, desde una valla o una rama de árbol despejada, que les sirve de percha. Su característica forma de obtener alimento, les hace fácilmente identificables. Los sexos son similares y adquieren el plumaje de adulto durante el segundo año calendario. En la península Ibérica son habituales dos de las seis especies presentes en el Paleártico occidental.

Papamoscas gris *Muscicapa striata. S. Arroyo*

Papamoscas gris *Muscicapa striata*

Papamosques gris

Migrante

Esta especie insectívora, de apagado plumaje pardo grisáceo, que no presenta dimorfismo sexual, mide 14 cm. de longitud. La cabeza grande, con el píleo aplanado, y las alas relativamente largas, forman una silueta inconfundible, siendo fácil de identificar, incluso a buena distancia. Es habitual observarla posada con su típica postura erguida en alguna rama despejada, desde donde se lanza en característico revoloteo para capturar todo tipo de insectos voladores, regresando al mismo posadero o bien a otro distinto.

Ampliamente distribuida por el Paleártico occidental y central. Está presente en una gran variedad de ambientes, preferentemente arbolados, aunque puede instalar su nido en oquedades de cualquier tipo, e incluso llegado el caso utilizar nidos de otras especies, circunstancia ésta frecuente en Gran Bretaña, donde ha utilizado nidos viejos de hasta doce especies diferentes. Es un migrante transahariano, y una de las aves estivales más tardías en regresar a sus zonas de cría. En el sur de Alicante es un nidificante común, aunque no abundante, siendo las zonas de reproducción más próximas a Tabarca, la Sierra de Santa Pola y los pinares litorales de La Marina y Guardamar, donde utiliza las horquillas de los pinos carrascos para instalar sus abiertos nidos.

En la isla, se le suele observar posado en lo alto de las paleras y el vallado del Faro; también en el pueblo, en aquellas zonas con arbolado (pinos, palmeras) de la plaza principal y junto a la Iglesia, y sectores de matorral detrás de la casa del Gobernador. El paso prenupcial es tardío, con registros entre el 5 y el 14 de mayo de 2001, Precisamente dicho día 14 de mayo, es el paseriforme migrante más abundante. Aunque durante el 17 de abril de 2003 se llegan a detectar un mínimo de 5 ex. Durante el paso postnupcial las observaciones ocurren entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre.

Papamoscas cerrojillo *Ficedula hypoleuca*

Papamosques menut

Migrante

Esta especie, de menor tamaño que el Papamoscas gris (12,5 cm) y bastante más rechoncho, tiene un plumaje muy variado. Así, los machos en época nupcial presentan un plumaje muy contrastado blanquinegro (con destacadas manchas blancas en las alas y frente), mientras que el resto de plumajes (hembras, jóvenes y machos en periodo no reproductor) son marrones en partes superiores y blanquecinos en las inferiores, pero siempre con pequeñas manchas blancas en las alas. Al igual que el Papamoscas gris se posa en una percha despejada, desde donde se lanza con cortos vuelos a la captura de pequeños insectos, retornando seguidamente a su posadero.

Su distribución durante el periodo reproductor se extiende desde el extremo noroeste de África, sube por el suroeste y centro de Europa hasta Escandinavia, alcanzando por el este Siberia occidental. Inverna en África, desde Costa de Marfil por el oeste, a Tanzania por el este.

Escaso en el Mediterráneo, nidifica en algunas zonas boscosas del norte de la provincia de Alicante. Tradicionalmente ha ocupado bosques caducifolios, aunque con la instalación de cajas nidos y la buena aceptación de este recurso por la especie es posible encontrarlo nidificando también en bosques de coníferas.

En Tabarca es observado tanto en los grupos de paleras del Campo, como en las zonas del pueblo con arbolado y matorral (palmeras junto a la Iglesia, casas del pueblo, matorral y vallados por detrás de la casa del Gobernador), siendo la presencia de este papamoscas muy limitada en el tiempo, especialmente durante la migración prenupcial. En el año 2001, tan solo coincidimos con el momento álgido del paso primaveral, el día 5 de mayo, con presencia de un buen número de ejemplares. En la primavera de 2002, se observan aves los días 10 y 11 de mayo. El paso postnupcial fue algo más amplio, con observaciones entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre.

Papamoscas cerrojillo *Ficedula hypoleuca. L. Fidel*

ORIOLIDAE

Aves arborícolas, de tamaño pequeño-mediano, que se alimentan de insectos, semillas y frutos. Tan solo una especie en Europa; el resto de especies habitan en regiones tropicales.

Oropéndola *Oriolus oriolus*
Oriol
Migrante

La Oropéndola es una bellísima ave de tamaño medio, con unos 24 cm. de longitud, que presenta un claro dimorfismo sexual, siendo los machos de un amarillo intenso, con las alas negras. La cola también es amarilla, con banda negra en el dorso. Las hembras y los jóvenes son más discretos, presentando una coloración verdeamarillenta, con garganta y pecho blancogrisáceos y listados de oscuro. Pico rosado, y patas grises. Es una especie difícil de observar, pues suele permanecer bien oculta entre el follaje de los árboles, detectándola con facilidad por el canto aflautado de los machos. Cuando se la sorprende en vuelo, descubrimos que posee un vuelo rápido y levemente ondulado. Es una especie típica de bosque de ribera, grandes jardines, bosques caducifolios y de coníferas, con frecuencia lindantes con campos de cultivo.

Se encuentra bien distribuida por toda Europa faltando sólo de los paises más nórdicos, Asia y el norte de África. En Europa es una especie de presencia estival, que marcha a África tropical para pasar el invierno. En la península Ibérica está bien repartida, aunque es algo más escasa en la cornisa cantábrica, y está ausente en zonas de alta montaña, regiones desarboladas y en las islas Baleares y Canarias. En la provincia de Alicante es una especie común en la mitad norte, con algún punto aislado en la mitad sur, ligada a los sotos de algunos ríos y barrancos con agua, así como pinares, generalmente en zonas de borde, lindantes con cultivos de secano o frutales. También en jardines de casas aisladas, con choperas, frutales o grandes árboles ornamentales.

En el sur de Alicante, tan solo hemos encontrado alguna pareja reproductora en los pinares del entorno del embalse de La Pedrera, próximos a zonas con agua (ramblas, canal del trasvase o grandes balsas de riego). Como migrante su presencia es bastante rara.

En Tabarca, tan solo una observación, comunicada por Adolfo Quiles, el día 24 de abril de 2003: Un macho, primero escuchado mientras permanecía oculto entre las formaciones mixtas de palera y oroval, situadas entre el castillo y el faro, siendo después observado en vuelo.

LANIIDAE

Paseriformes solitarios, de pequeño a mediano tamaño, cabeza grande y cola larga. Los alcaudones se posan en lugares prominentes y despejados, desde donde se dejan caer para atrapar sus presas (pequeñas aves y reptiles o grandes insectos). Acostumbran a empalar las presas sobrantes en arbustos espinosos, o para desgarrarlas con facilidad. En el Paleártico occidental se reproducen 9 especies, de las que 4 de ellas lo hacen en una u otra medida en la península Ibérica.

Alcaudón meridional *Lanius meridionalis*

Botxí

Visitante invernal

Es el mayor de nuestros alcaudones, con unos 24 cm. de longitud. Destacan en este pájaro su enorme cabeza, y una cola bastante larga y redondeada. El dorso de la cabeza y del cuerpo, así como el obispillo son grises. Presenta un antifaz negro, siendo del mismo color las alas (con alguna mancha blanca) y la cola (con las plumas externas blancas). Las partes inferiores son rosadas, con cierta tonalidad rojo-vinosa. Pico y patas negros. Habita en zonas abiertas, con presencia de árboles y matorrales dispersos, siendo un ave que caza al acecho, vigilando desde posaderos destacados situados en lo alto de arbustos, árboles y cables del tendido eléctrico. Desde estos lugares con frecuencia emite un melodioso reclamo, que se escucha a bastante distancia. Sus presas principales son insectos y otros invertebrados, que captura generalmente en el suelo, así como lagartijas, musarañas, ratoncillos y pequeños pájaros (generalmente aves jóvenes e inexpertas).

Esta especie ha sido recientemente separada del Alcaudón real, y se distribuye en Europa, por Francia y la península Ibérica. En España está ampliamente repartido como nidificante, estando ausente tan solo en las islas Baleares, y algunas zonas cantábricas y gallegas. También nidifica en las islas Canarias.

En la provincia de Alicante es una especie común y ampliamente repartida, siendo en el sur de Alicante relativamente abundante, especialmente en zonas deforestadas y degradadas, así como cultivos abandonados. Un ejemplo de hábitat muy idóneo para la especie son los alrededores del Clot de Galvany, donde en un espacio relativamente reducido pueden nidificar del orden de unas 8-10 parejas. Su presencia llega hasta el borde del mar, pues algunas parejas se instalan en los pinares de las dunas del Carabassí y La Marina-Guardamar, y cazan en las zonas más aclaradas próximas a la playa.

Alcaudón meridional *Lanius meridionalis*. ***J. Pérez***

En Tabarca, durante el periodo de estudio, nos había llamado la atención su ausencia, pues realmente posee un hábitat adecuado, al menos para ser usado temporalmente durante el invierno, estando tan próxima la isla al cabo de Santa Pola y al paraje de las dunas del Carabassí, Clot de Galvany y Balsares, donde la especie posee buenas densidades. Sin embargo, solamente hemos contactado con la especie el día 23 de noviembre de 2002, observando 1 ejemplar en la "vertiente" norte del Campo de la isla, adyacente al segundo grupo de paleras, posado en orovales de buen porte, desde donde capturaba en el suelo pequeños escarabajos. En enero de 2006 volvemos a ver 1 ex. en las proximidades del Faro.

Alcaudón común *Lanius senator*

Capsot

Migrante

Es un pájaro que mide 17 cm. de longitud, cuyo plumaje presenta el dorso negro, con llamativo capirote y nuca de color castaño-rojizo. En la cara destaca la frente y una amplia banda ocular de color negro El obispillo es blanco, y las alas son negras con manchas y franja alar blancas. La cola es negra con las plumas externas blancas. Las partes inferiores son de color blanco. Se alimenta de insectos y lagartijas, y ocasionalmente algún micromamífero y pajarillo. Caza al acecho desde posaderos destacados: árboles, arbustos y cables del tendido eléctrico. Vive en zonas abiertas con arbolado disperso, dehesas, cultivos arbóreos (almendros, olivos, etc.) y borde de bosque, instalando su nido en los árboles.

Es una especie de distribución principalmente circunmediterránea (sur de Europa y norte de África), aunque se extiende asimismo por amplias zonas del centro y oeste de Europa, alcanzando Turquía y Oriente Próximo. Es un migrante transahariano. En España, muestra una amplia distribución, salvo en extensas zonas cantábricas y de Galicia. Nidifica también en Baleares y está ausente de Canarias. En Alicante se reparte bastante uniformemente por toda la provincia.

En la Isla, registramos el paso primaveral a partir del 17 de marzo de 2001, y hasta el 21 de mayo. El mayor número de ejemplares, con mínimo de 6-10 aves, se produjo el 14 de mayo. Precisamente la presencia de aves durante el mes de mayo, aparentemente bien instaladas en el campo de la isla nos hacía pensar en una segura nidificación, incluso llegamos a ver algún ejemplar con ceba, quizás para obsequiar a su pareja, sin embargo esta posibilidad se desvaneció a final de mayo, ausentándose definitivamente. De hecho, la especie aparece en la isla como nidificante posible en el *Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad Valencina*, y aunque podría nidificar, durante las primaveras de 2001 y 2002 no lo ha hecho, y no pensamos que realmente pueda criar en la isla. En paso postnupcial se encuentra prácticamente ausente,con una sola observación de un ejemplar juvenil el 2 de agosto de 2001 que, por cierto, llevaba adherida en la cara una semilla pinchosa. Durante su estancia en el campo de Tabarca, le hemos visto capturando escarabajos así como salamanquesas, una de las cuales hemos observado cómo la devoraba, empalada en las espinas de un oroval.

Alcaudón común *Lanius senator. J. Pérez*

STURNIDAE

Aves sociables, que recuerdan a los zorzales. En comparación con la mayoría de paseriformes, tienen un buen tamaño. Por el suelo se mueven con grandes zancadas y tienen un vuelo rápido y directo. Los reclamos y cantos son poco armoniosos, aunque algunas especies son muy buenas imitadoras de otras especies. En la península Ibérica es habitual observar dos de las seis especies presentes en el Paleártico Occidental

Estornino pinto *Sturnus vulgaris*. *S. Arroyo*

Estornino pinto *Sturnus vulgaris*

Estornell

Migrante e invernante

Pájaro de aspecto compacto, de 21 cm. de longitud, cuyo plumaje oscuro, con brillos metálicos, y gran número de pintas blancoamarillentas, así como la cola corta y el pico más largo, distinguen ligeramente a esta especie de su cercano pariente el Estornino negro. No obstante, las diferencias entre esta especie y el Estornino negro son facilmente apreciables.

Está ampliamente distribuido por toda Europa, siendo sedentarias las poblaciones del sureste y del occidente europeo. En España se cita su reproducción desde la década de los setenta del pasado siglo XX, extendiéndose en toda Cataluña, Navarra, País Vasco y Cantabria.

Tiene hábitos insectívoros durante la época reproductora, mientras que durante la invernada se transforma en un ávido consumidor de frutos y semillas, convirtiéndose en un azote de determinados cultivos como el olivo, cuyo fruto es sumamente apreciado por los extensos bandos de esta especie. Con respecto a la relación entre el Estornino pinto y las aceitunas, Bernis (1960) señala que las áreas de invernada de la especie en la Península coincidían a grandes rasgos con la distribución del olivo y el acebuche.

Los dormideros de Estornino pinto son espectaculares por la cantidad de individuos que pueden llegar a congregarse. Tradicionalmente éstos se instalaban en grandes carrizales, aunque en los últimos años podemos verlos instalados en grandes árboles del centro de núcleos urbanos; de todas maneras se ha comprobado un acusado descenso en el número de aves invernantes de la especie que acuden a la mitad meridional de la península Ibérica, y manteniéndose o aumentando en la septentrional.

En Tabarca se realizan unas pocas observaciones durante los meses otoñales (a partir de octubre) e invernales, cuya presencia puede dilatarse hasta principios de marzo. Los registros corresponden a unos pocos individuos (máximo de 7 aves), integrados en los bandos más numerosos de estorninos negros, y observados en los grupos de paleras y orovales entre la Torre de San José y el Faro.

Estornino rosado *Sturnus roseus*

Estornell rosat

Divagante

Este estornino de 21 cm. de longitud, tiene el plumaje del cuerpo rosáceo, con las alas, cola y cabeza de color negro. En nuestro país es una especie divagante, que procede de Turquía y de la zona del Cáucaso, observándose ocasionalmente ejemplares integrados en bandos de estorninos pintos.

En Tabarca tan solo una observación de un ejemplar adulto el 10 de abril de 1993, en la zona central de la isla (J. Westers E., en DIES, J.I. y DIES, B (eds.) 1995. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1993. Estació ornitològica L´Albufera, Valencia).

Estornino negro *Sturnus unicolor*
Estornell negre
Residente

El Estornino negro mide 21 cm. de longitud y presenta un plumaje negro brillante, con las plumas de la garganta y del pecho algo más largas. Mantiene un comportamiento similar al Estornino pinto.

La distribución mundial de esta especie se limita a la península Ibérica, norte de África y a las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Mantiene una distribución antagónica con el Estornino pinto, y en las zonas del norte de España, donde se reproducen ambas especies se han dado casos de hibridación, calculándose que existe hasta un 1% de individuos intermedios (Motis 1992).

De forma habitual viven en la isla unas 50-60 aves, que basculan entre el pueblo y el Campo. Nidifican en agujeros situados en construcciones humanas, principalmente en la deteriorada Iglesia y la Torre de San José. Algunas parejas también en diferentes casas del pueblo, e incluso en grietas de los acantilados de algún islote. En total, nidifican un mínimo de 15-20 parejas.

El periodo reproductor se inicia a finales de marzo y los machos emiten con gran intensidad sus cantos, que consisten en una gran cantidad de sonoros silbidos (de todos modos, cantan prácticamente durante casi todo el año), y tienen pollos en los nidos ya en la segunda quincena de abril. El 5 de mayo ya observamos un grupo de al menos 25 jóvenes volanderos. Estas aves realizan dos puestas, pues todavía se observan adultos portando ceba desde el Campo hacia el pueblo a mediados de junio.

Los estorninos, o al menos una parte importante de ellos, podrían ausentarse de la isla entre mediados de julio y finales de agosto, pues hemos registrado ausencias en alguna visita durante este periodo, siendo un lugar de tan reducidas dimensiones, y unas aves fácilmente localizables. Se alimentan principalmente en el campo de la isla, a donde acuden a forrajear en bandos numerosos en busca de todo tipo de invertebrados, como insectos (consumen un buen número de coleópteros), arañas, gusanos, etc., sin despreciar semillas y algunos frutillos. Frecuentan particularmente los dos grupos de paleras y la zona del Faro, donde gustan de posarse y emitir sus agudos silbidos. Además, imitan el canto de otras aves, habiendo oido notas de Oropéndola, Carbonero común y otros…, lo cual no deja de ser curioso pues son aves que no se encuentran en la isla, o su presencia es muy ocasional.

El Estornino negro podría ser un colonizador reciente, ya que no aparece mencionado en el A.A.N.C.V.(observacs. de campo de 1987), y se trata de un ave que difícilmente pasa desapercibida.

Estornino negro *Sturnus unicolor. L. Fidel*

PASSERIDAE

Pájaros de pequeño tamaño, algo rechonchetes, y de plumajes discretos, generalmente pardos. Algunas especies presentan un claro dimorfismo sexual, presentando los machos manchas negras, grises o castaño intenso en cabeza y parte superior del cuerpo. Tienen la cola y las patas cortas, desplazándose por el suelo a saltitos. Poseen picos gruesos, de granívoro, y se alimentan en el suelo. Los jóvenes se parecen a las hembras. Son aves principalmente sedentarias, muy sociables y gregarias, nidificando de forma colonial, y formando grandes bandadas fuera del periodo reproductor. Son aves típicas de asentamientos humanos, campos de cultivo, roquedos, etc. Construyen sus nidos en todo tipo de oquedades de viviendas humanas, roquedos o árboles. En estos últimos, también elaboran nidos esféricos entre las ramas.

Gorrión chillón *Petronia petronia*. *S. Arroyo*

Gorrión común *Passer domesticus*

Teuladí

Residente

Esta especie "doméstica", es el típico pajarillo ligado a los asentamientos y habitáculos humanos. Mide unos 14 cm., y los sexos presentan plumajes diferenciados. Así, los machos presentan un capirote gris, enmarcado de castaño, y un babero negro, con el dorso del cuerpo pardo claro, listado de oscuro. Las hembras y los jóvenes son de color pardo claro, con listas oscuras en el dorso, y ceja pálida.

Habita en todo el continente europeo y la cuenca mediterránea, faltando solo en parte de las regiones más septentrionales del continente. Se encuentra en todos los continentes, donde ha sido introducido. En España ocupa toda la península y las islas Baleares.

En la isla es bastante común, con buen número de ejemplares que residen en el pueblo, nidificando en todo tipo de huecos que encuentran en muros y tejados. Aunque en el pueblo, la playa y los alrededores de los restaurantes encuentran parte de su alimento (restos de comida abandonados, o hallados junto a los contenedores de basura), nutridos bandos de gorriones se desplazan habitualmente al Campo de la isla para alimentarse, forrajeando en los herbazales y entre los matorrales, en busca de semillas silvestres y algunos insectos (éstos especialmente en la primavera, para alimentar a sus pollos), coincidiendo con frecuencia con los negros bandos de estorninos. En referencia a la observación de paseriformes, los gorriones que menudean en el Campo, son con frecuencia un elemento distractor, ante la identificación de otros pájaros migrantes más raros, y cuyo diagnóstico es, a menudo, cuestión de "desenfundar" rápidamente los prismáticos para tener una breve y fugaz visión del ave observada.

*Esta especie aparece como nidificante seguro en el AANCV (datos de campo de 1987)

Gorrión moruno *Passer hispaniolensis*

Teuladí de pasa

Visitante

Gorrión de 14 cm. de longitud, con marcado dimorfismo sexual, donde los machos lucen un plumaje con el capirote y la nuca de color castaño, y una ceja blanca, así como una amplia pechera negra, extendida también por los flancos. Las mejillas son blancas. El dorso corporal es pardo-oscuro con listado negro. Las hembras son muy parecidas a las del gorrión común, pero algo más oscuras en el dorso. Puede hibridarse con el Gorrión común.

Presenta una distribución fragmentaria en las regiones mediterráneas, y en Iberia es más común en el cuadrante suroccidental peninsular, y en las islas Canarias, con algunos puntos muy localizados en Cataluña y Levante.

En general es un gorrión de campo, que vive y nidifica en bosques y dehesas de encinas, alcornoques o pinar, así como algunos sotos de ríos, generalmente próximos a campos

cultivo, nidificando también en los enormes nidos de cigüeñas y ciertas rapaces. Tras el periodo reproductor se agrupan en bandos que protagonizan ciertos movimientos dispersivos, e incluso probablemente un número indeterminado de estos gorriones pase al continente africano para invernar.

En Tabarca existe una sola cita, de un ejemplar, observado el 27 de octubre de 1997, por Peter G. Salter (La Matruca nº IX, verano/otoño de 1997).

Gorrión chillón *Petronia petronia*
Pardal roquer
Migrante

Rechoncho gorrión de 14 cm., de color pardo claro, muy parecido a una hembra de gorrión común, con una nítida ceja blanca, y sobre ésta una lista negra. Las partes infs. son blanco sucio, presentando una mancha amarilla en la garganta, nada fácil de observar. La cola es corta, y presenta unas llamativas manchitas blancas en el extremo de las plumas.

Se distribuye de forma discontinua por la cuenca mediterránea, llegando por Turquía hasta el mar Caspio. En Iberia, está presente en casi toda la Península, aunque está prácticamente ausente en la cornisa cantábrica y Galicia, así como de amplias áreas del centro-sur. Asimismo, aparece como nidificante en Baleares y Canarias.

Nidifica en pequeñas colonias, ubicando sus nidos en agujeros de roquedos, edificios y ruinas aisladas por el campo, murallas, canteras, etc., generalmente en zonas bien soleadas. Es una especie sedentaria, aunque tras la reproducción protagoniza movimientos dispersivos y nómadas, generalmente por campos de cultivo de secano, zonas esteparias con baldíos y eriales, a menudo formando bandos de varios cientos de aves.

En Alicante es una especie común, nidificando principalmente en las comarcas del interior y de la mitad norte, en cortados y casas de campo aisladas, con frecuencia deshabitadas o en ruinas. Falta en las zonas costeras del sur de Alicante, encontrando las primeras poblaciones en los roquedos de la sierra de Crevillente.

En Tabarca, se identifica un ejemplar el 7 de mayo de 2001, que permanecía en el suelo del herbazal situado al este del Faro, levantándose al paso del observador de aves, y posándose en el vallado que rodea el Faro, donde permaneció un ratito, para marcharse posteriormente. Nuevamente, el 11 de mayo de 2002 observamos otro ejemplar de esta especie, que también permanecía en el suelo, frente a la casa del Campo, posándose en la alambrada que rodea al Faro y a una parte del Campo. Media hora más tarde seguía en el camino que bordea dicha alambrada, donde permanecía buscando semillas. No deja de ser llamativa la coincidencia en las fechas (primera quincena de mayo) en 2 años consecutivos, que podría estar relacionada con algún pequeño movimiento migratorio de algunas de estas aves, en unas fechas en las que la mayoría de gorriones chillones está nidificando, o al menos ya asentados en los lugares de cría. El 17 de abril de 2003 se detecta un ejemplar posado en un oroval.

FRINGILLIDAE

Familia de pájaros granívoros, generalmente de pequeño tamaño. Disponen de un pico corto y robusto que, dependiendo de su especial morfología en cada especie, les permite acceder a un tipo u otro de una gran variedad de frutos secos y semillas. Tienen una complexión compacta y aspecto rechoncho. El plumaje de los sexos presenta una apreciable diferencia, disponiendo los machos generalmente de un plumaje de colores más brillantes e intensos que las hembras. El plumaje de los jóvenes suele ser como el de las hembras y adquieren el plumaje de adulto a partir del primer otoño.La mayoría de las especies se tornan gregarias una vez que finaliza el periodo reproductor, pudiendo formas grandes bandos, que en ocasiones pueden congregar distintas especies de la familia, así como gorriones y escribanos.

Pinzón vulgar *Fringilla coelebs. A. Saiz*

Pinzón vulgar *Fringilla coelebs*

Pinsà

Migrante

El Pinzón vulgar tiene una longitud de 15 cm., siendo una especie fácilmente identificable en todos sus plumajes, sobre todo por las conspicuas manchas alares de color blanco, plumas externas de la cola blancas y obispillo verde grisáceo. Los machos tienen los lados de la cabeza y el pecho rojizos, y el píleo y la nuca gris azulado. Las hembras y los jóvenes tienen el dorso verdoso y las parte inferiores de un claro gris ocráceo. Acostumbra a alimentarse en el suelo por donde se desplaza con unos característicos saltitos.

Está ampliamente distribuido por casi toda Europa, y cría en todo tipo de bosques bien desarrollados. El Pinzón vulgar es un migrador parcial, que cuanto más sureñas son sus poblaciones, menor es el número de ejemplares migrantes. No obstante, es común que realice pequeños movimientos altitudinales durante el invierno huyendo de las zonas más frías y montañosas, trasladándose a zonas más bajas y abiertas como dehesas y cultivos arbolados.

En la provincia de Alicante nidifica en las sierras del interior, en pinares o formaciones mixtas de pino y carrasca, generalmente en exposiciones de umbría. En el sur de Alicante es un invernante común, donde frecuenta pinares y cultivos siendo habitual observarle tanto en la Sierra de Santa Pola, como en el entorno del Clot de Galvany y las dunas entre La Marina y Guardamar.

En Tabarca se han realizado observaciones de 1 a 3 aves, entre el 19 de octubre y el 24 de noviembre, destacando un pequeño grupo de 3 ejemplares (un macho y 2 hembras) que permanecieron durante la segunda quincena de octubre en el Campo, alimentándose de semillas silvestres, que encontraban en el suelo de los herbazales adyacentes al grupo de paleras más próximo al Cementerio. También se detectó 1 ejemplar en el grupo de palmeras junto a la Iglesia.

Verdecillo *Serinus serinus*

Gafarró

Invernante

Con 11,5 cm. de longitud, el Verdecillo es el fringílido más pequeño de Europa. Su pequeño tamaño, el pico corto y grueso, junto al obispillo amarillo (adultos), le hacen fácilmente identificable. En primavera es muy fácil de detectar debido a su característico canto, muy agradable, aunque algo monótono, y a sus erráticos vuelos nupciales, que recuerdan el volar del murciélago.

Se distribuye por la cuenca mediterránea y Europa, excepto en Escandinavia y en la mayor parte de las islas Británicas. Es considerado un migrador parcial en toda su área de distribución, invernando las poblaciones centroeuropeas generalmente en torno al Mediterráneo. En España efectua desplazamientos desde el centro y norte peninsular hacia zonas más meridionales.

Es extraordinariamente común en el sur de Alicante, ocupando para nidificar todo tipo de zonas arboladas que le proporcione unas mínimas condiciones, siendo el pájaro nidificante más frecuente, ocupando olivares, almendros, naranjos y limoneros, así como pinares y jardines. Es un nidificante temprano, que comienza a reproducirse a partir de mediados de febrero, teniendo pollos volanderos ya en la primera quincena de marzo. Realiza 2-3 puestas en cada temporada. Una vez terminada la época reproductora, esta especie forma grandes bandos que frecuentan cultivos y zonas más o menos abiertas.

En Tabarca, durante el periodo de estudio, escasas observaciones de pequeños grupitos (máximo de 6 aves) entre el 14 de diciembre de 2000 y principios de febrero de 2001. Aparte de estos ejemplares invernantes, se observan algunos individuos en migración durante el mes de marzo, siendo la última observación el 5 de mayo de 2001, probablemente algún migrante tardío, aunque también podría tratarse quizás de algún ejemplar divagante a partir de la costa próxima.

Verdecillo *Serinus serinus. J. Pérez*

Verderón común *Carduelis chloris*

Verderol

Migrante e invernante

Fringílido de aspecto robusto, de 15 cm. de longitud. Plumaje de color verdoso, pico potente y cola relativamente corta. El Verderón frecuenta hábitats similares al Verdecillo. Es característico el reclamo tipo cigarra del macho, que emite desde posaderos prominentes.

Se distribuye ampliamente por toda Europa, excepto el interior montañoso de Escandinavia. Nidifica en todo tipo de zonas arboladas: sotos, pinares, olivares, almendros, cítricos, próximos a zonas abiertas. Su abundancia está asociada a unas temperaturas no excesivamente frías. En invierno forma bandos, en compañía de otros fringílidos, que frecuentan herbazales, barbechos y cultivos.

Verderón común *Carduelis chloris. A.J. Ramos*

En el sur de Alicante, es un nidificante muy común en determinadas zonas aclaradas de la pinada de las dunas de Elx y Guardamar. En esta zona, se alimentan en los sectores de las dunas más próximas al mar, donde encuentran las semillas de distintas especie de plantas como la Bufalaga marina y el Cornezuelo.

En Tabarca se han observado pequeños grupos de verderones (entre 6-12 ejemplares, con máximo de 19 aves), buscando semillas y granos en los herbazales salpicados de matorrrales dispersos del Campo. Su presencia se extiende de manera regular desde mediados de octubre hasta mediados o finales de marzo, aunque todavía se puede producir alguna observación hasta finales de abril-principios de mayo de aves migrantes, siendo posible observar en esos momentos finales de su estancia en Tabarca, a algún macho cantando desde posaderos destacados. Tras su ausencia primavero-estival, las primeras aves retornan a partir de mediados de octubre, con algunos migrantes y otros ejemplares que se quedarán a invernar en la isla.

Lúgano *Carduelis spinus*

Lluer

Migrante

El Lúgano es un pequeño pájaro de unos 12 cm. de longitud, con la cabeza pequeña, pico puntiagudo y la cola corta. Posee un plumaje de color gris verdoso en la espalda, y alas oscuras con contrastadas manchas amarillas, lo que facilita su identificación en vuelo. Los machos presentan una mancha negra en el pileo y garganta.

Su área de distribución se extiende por todo el Paleártico, desde Europa occidental a las costas del Pacífico. Habitualmente realiza migraciones hacia el sur desde sus zonas de cría, las cuales algunos años adquieren carácter irruptivo, debido a la escasez de alimento. Las recuperaciones de aves anilladas invernantes en la Península muestran una mayor presencia en la mitad norte y costa mediterránea.

Su presencia invernal en el sur de Alicante es sumamente irregular de un año para otro, en cuanto al número de individuos detectados. De todas formas, suelen registrarse banditos de migrantes en paso en octubre y noviembre, quedando algunos grupos más o menos numerosos durante el invierno, principalmente en algunos sectores de pinar de la Sierra de Santa Pola, lomas del Carabassí y dunas de Elx y Guardamar, alimentándose en lo alto de los pinos.

En Tabarca, durante el periodo de estudio, tán solo un contacto con la especie: El 26 de octubre de 2001, un grupo de al menos 3 ejemplares es detectado acústicamente, por su típico reclamo, entrando desde el mar y sobrevolando la zona norte de la isla.

Pardillo común *Carduelis cannabina*
Passerell
Migrante e invernante

El Pardillo común (13 cm.) tiene una coloración marrón general, más intensa en el dorso, que en los machos es de color castaño. En plumaje nupcial, los machos también tienen la cabeza grisácea, con manchas rojas en la frente y el pecho, que apenas se notan durante el otoño e invierno. Su plumaje es bastante discreto si lo comparamos con otras especies de la familia.

Se encuentra ampliamente extendido por toda Europa (salvo Islandia y gran parte de Escandinavia), gran parte de Asia, así como en el Norte de África.

Pardillo común *Carduelis cannabina*. *A. J. Ramos*

Es un nidificante común en el interior de la provincia de Alicante, instalando sus nidos en arbustos espesos y árboles de áreas abiertas y esteparias, cultivos de secano, pinares abiertos, y zonas de alta montaña. Durante el invierno se produce la llegada de buen número de aves migrantes. Esta especie, al igual que otros fringílidos, han sufrido un importante retroceso en sus contingentes, sobre todo en Europa occidental (en Gran Bretaña se ha documentado un descenso en el éxito reproductor y en las tasas de supervivencia estival e invernal), achacado al desmesurado uso de herbicidas e insecticidas.

Unos pocos ejemplares (el máximo registro es un grupo de 10 aves) invernan en la isla, hasta final de marzo, aunque puede pasar algún ejemplar en migración todavía hasta la segunda mitad de abril. Suelen alimentarse generalmente en el suelo de herbazales, en busca de semillas y granos, no lejos de los bandos de bisbitas comunes y alondras. Tras su marcha, con el inicio de la primavera, y su ausencia estival, regresan las primeras aves a partir del mes de octubre.

Camachuelo trompetero *Bucanetes githagineus*
Pinsà trompeter
Migrante

Este paseriforme, pequeño (14 cm.) y regordete, de color arena, es típico de zonas desérticas y subdesérticas. Los machos, en periodo nupcial, presentan la cabeza de color gris, la cara, partes inferiores y obispillo de color rosado, y el grueso pico, de color rojo. Las hembras son bastante más apagadas. Habita áreas desérticas y predesérticas del norte de África, y Oriente Próximo. También nidifica en las islas Canarias.

Las únicas zonas de nidificación estables de esta especie en la península Ibérica se encuentran en las provincias de Almería y Murcia. Sin embargo, recientemente se han detectado dos localidades de nidificación en la provincia de Alicante, situadas en barrancos semiáridos subsidiarios del río Monnegre (entre Alicante y Jijona), donde existe una espléndida colonia, y en la sierra de Albatera, aquí con un menor número de ejemplares. Estas aves nidifican muy pronto, a principios de marzo, y es probable que realicen movimientos migratorios postreproductores que les pongan en contacto con las aves de la provincia de Almería, que se concentran en bandos durante el invierno, en lugares próximos a la costa del cabo de Gata.

En Tabarca, tán solo ha sido detectada su presencia en dos ocasiones: 1-2 aves en mayo-junio de 1989 (1 macho en mayo, comunicado por JHP(*), y 1 ex. posiblemente hembra, el 8 de junio, cita de RE (**).

(*). Jesún Huertas Pedrero, en DIES, J. I. y DIES, B. (Edts.). Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1989. Valencia, 1990.

(**) Raúl Escandell, en DIES, J. I. y DIES, B. (Edts.) 1995. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1993. Estació Ornitològica L´Albufera, Valencia.

Página siguiente: Camachuelo trompetero *Bucanetes githagineus S. Arroyo*

EMBERIZIDAE

Este grupo incluye a los escribanos, pequeños pájaros de hábitos terrestres, de alimentación granívora, por lo que poseen fuertes picos cónicos. Sexos generalmente distintos, salvo el Triguero, luciendo los machos llamativos plumajes, mientras que las hembras y los jóvenes son más discretos y apagados. Poseen colas generalmente largas. Son pájaros de campo abierto, con arbustos y árboles dispersos, generalmente en forma de setos y linderos. Se alimentan en el suelo, por donde se desplazan a saltitos. Poseen cantos fuertes, pero monótonos y repetitivos. Ubican sus nidos, en forma de taza, en el suelo o en matorrales y arbustos, generalmente a baja altura. Son aves sociables, formando bandos fuera del periodo reproductor.

Escribano hortelano *Emberiza hortulana*. *S. Arroyo*

Escribano hortelano *Emberiza hortulana*

Hortolà

Migrante

Es un pájaro de 16 cm. de longitud, con la cabeza y el pecho de color verdegrisáceo claro. Garganta y bigotera amarillas, con anillo ocular amarillo. Las zonas infs. son rosa-anaranjadas, con el dorso pardo y listado de oscuro. El pico y las patas son rosados. Las plumas externas de la cola son blancas. Los sexos son similares, con las hembras más apagadas.

Es un escribano bien repartido por toda Europa, aunque evita las regiones de clima atlántico. En España aparece principalmente en la mitad norte, aunque está ausente en la cornisa cantábrica y Galicia, de clima atlántico. En la mitad sur, se presenta tan solo en algunos enclaves montañosos.

El hábitat que ocupa son terrenos abiertos con matorral, arbustos o arbolado disperso, generalmente por encima de los 1.000 m. de altura, en laderas secas y bien soleadas, así como en cultivos abiertos, con setos. Nidifica en el suelo o en matorral bajo. Es un ave de presencia estival en la Península, siendo un migrante transahariano.

En Tabarca, mínimas citas, y exclusivamente primaverales, con un grupo de 4 ejemplares (3 machos y 1 hembra) el 5 de mayo, y 1 ejemplar el 7 de mayo. Estas aves permanecían en el suelo entre el grupo principal de paleras y orovales, volando con el paso del observador, y que se posaron unos instantes en lo alto de las paleras, marchando después para volver a ocultarse.

Triguero *Miliaria calandra*

Cruixidell

Estival

El Triguero es el más grande de los escribanos, midiendo unos 18 cm. Es un pájaro característico de espacios abiertos, generalmente cultivos cerealistas, alfalfales y todo tipo de herbazales. Es principalmente sedentario, aunque puede realizar movimientos nómadas y dispersivos, e incluso se produce una pequeña entrada de aves europeas, que invernan en la península Ibérica.

Es un pájaro algo rechoncho, de color pardo, con abundantes listas en el pecho y los flancos. El pico es grueso y amarillento. Sexos iguales. Los machos cantan durante la primavera desde posaderos (arbustos y árboles, así como desde el tendido eléctrico o telefónico), y poseen un vuelo lento, tembloroso, con las patas colgando. Es un ave gregaria, que forma bandos fuera del periodo reproductor.

Es un ave ampliamente distribuida por casi todo el continente europeo (falta en Fenoescandia) y la península Ibérica, estando ausente en los grandes macizos montañosos, áreas boscosas y cultivos arbolados.

El Triguero, en el sur de Alicante, habita todo tipo de terrenos abiertos, con algunos árboles dispersos, zonas de saladar lindantes con cultivos de algunos de nuestros humedales, aunque donde es más numeroso es en zonas con parcelas cerealistas o campos de alfalfa, como son los cultivos de la zona sur de El Hondo o alrededores del Hondo de Amorós. Durante el invierno, pese a ser un pájaro de buen tamaño, formar bandos, y permanecer en la zona, pasa bastante desapercibido

En la isla las primeras aves llegan a partir de mediados de marzo (primera observac. de 2 aves el 31 de marzo de 2001, y grupos de 7-9 ejemplares entre mediados de marzo y principios de abril de 2002), con emisión de su típico canto, monótono pero potente, y que emiten desde algún posadero destacado, como desde lo alto de algún matorral o arbusto, así como posados en el vallado que rodea el Faro. En mayo se observa un grupo familiar de 5 ejemplares (adultos y pollos volanderos). La especie construye sus nidos muy bien escondidos entre la hierba. La última observación primaveral es de 2 ejemplares el 13 de junio de 2001, en herbazal-matorral junto a la puerta oeste del pueblo. Después, tras una ausencia estival (aunque podría permanecer -¡poco probable!- de forma discreta en la isla durante el verano, con actividad únicamente al amanecer y atardecer), volvemos a realizar una observación otoñal de 1 ave el 19 de octubre.

Triguero *Miliaria calandra.* ***S. Arroyo***

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, J. S., MONBAILLIU, X. & PATERSON, A. M. 1993. Estatus y Conservación de Aves Marinas. Actas del IIº Simposio MEDMARAVIS. SEO. Madrid.

BAÑULS DOSPITAL, C. 1995. isla de Tabarca. Cristina Bañuls (ed.). Alicante.

BEAMAN, M. & MADGE. S. 1998. Aves de Europa, norte de África y Próximo Oriente. Ediciones Omega.

BALLESTEROS, G.A. & CASADO, J. 2000. Guía de Aves Acuáticas del mar Menor. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la región de Murcia. Dirección General del Medio natural.

CAMPOS, B. et al. 2001. Atlas de las Aves Nidificantes del Alto Vinalopó (Alicante). Asociación Villenense de Amigos de la Naturaleza. Villena (Alicante).

CLAVELL, J. 2002. Catàleg dels ocells dels Paisos Catalans. Lynx Edicions.

COSTA et al. 1984. Estado actual de la flora y fauna marinas en el litoral de la Comunidad Valenciana. Publicaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón. Castellón.

CRAMP, S. SIMMONS, K. E. L. (Eds). 1982. The birds of Western Paleartic.

DIAZ, M.; ASENSIO, B. & TELLERIA, J.L. 1996. Aves Ibéricas I. No paseriformes. J.M. Reyero Editor.

DIES, B., DIES, J. I., OLTRA, C., GARCÍA, F. J. & CATALÁ, F. J. 1999. Las aves de L´Albufera de Valencia. Edita Vaersa.

DIES, J. I. & DIES, B. 1990. Presencia de Stercorariidae en aguas litorales del Golfo de Valencia (Mediterráneo Ibérico). Medi Natural 2: 85-96.

DIES, J. I. & DIES, B. (eds.). Anuarios ornitológicos de la Comunidad Valenciana años 1988 a 1994. Estació ornitològica L´Albufera. Valencia.

DIES, J. I. & DIES, B. 1995. Lista de las Aves de la Comunidad Valenciana. Estatus y Criterios de Selección para la colaboración en el Anuario Ornitológico. Editado por J. I. Dies y B. Dies.

DIES, J.I.; GIMÉNEZ, M.; MARTÍNEZ, A.; DOLZ, C. Y HUERTAS, J. Localización y Censo de los núcleos coloniales reproductores de aves marinas, en tramos rocosos e islas de la Comunidad Valenciana (años 1988 y 1989).

LA ISLA DE TABARCA, en Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana. 1998. Periódico Las Provincias.

GARRIDO, H. 1996. Aves de las Marismas del Odiel y su entorno. Editorial Rueda.

GIL-DELGADO, J. A.; LÓPEZ, G.; RICO, L.; SIRVENT, M. I.; VILLAPLANA, J. & ALBENTOSA, L. 1989. Análisis de la distribución de la avifauna nidificante en la provincia de Alicante. Mediterránea 11: 77-120.

GONZÁLEZ ARPIDE. Los tabarquinos.

MARTÍ, R. & RUIZ, A. La Pardela balear, ave del año 2001. La Garcilla nº 110 (14-17), 2001. SEO/BirdLife.

MARTÍNEZ MORELLÁ. Matrícula de los tabarquinos.

MAYOL, J. & AGUILAR, J. S. La Pardela balear, endémica y amenazada. La Garcilla nº 102 (10-13), 1998, SEO/BirdLife.

MCGEEHAN, A. & GUTIÉRREZ, R. La Pardela balear y la Pardela mediterránea. La Garcilla nº 102 (14-16), 1998. SEO/BirdLife.

MIKKOLA, H. 1995. Rapaces Nocturnas de Europa. Editorial Perfils

MÍNGUEZ, E. Censo, cronología de puesta y éxito reproductor del Paiño común (Hydrobates pelagicus) en la isla de Benidorm.1994, en ARDEOLA 41(1), 1994, 3-11.

NAVARRO, J. D. "Avifauna de las salinas costeras sudalicantinas". Págs. 205-211.

PALMER, M. (1993). A birdwatching guide to the Costa Blanca. Arlequin publications. Chelmsford, Essex.

PATERSON, A. M. Las Aves Marinas de España y Portugal 1997. Lynx editions.

PUJOL, J. A. & CALVO, J. F. 1997. TORREVIEJA. Cuadernos para su estudio. I MEDIO NATURAL. Ayuntamiento de Torrevieja. Alicante.

RAMOS, A. J. & FIDEL, L. 1999. Las aves de los humedales del sur de Alicante y su entorno. Editorial Club Universitario. Alicante.

RAMOS, A. J., FIDEL, L. & PAVÓN, M. A. 2002. Las Aves del Clot de Galvany. Ajuntament d´Elx.

RAMOS ESPLÁ, A. et al. 1994. Trabajos de campo en la Reserva Marina de Tabarca. Universidad de Alicante. Instituto de Ecología litoral de Alicante.

RAMOS FOLQUÉS: La isla de Tabarca.

RICO, L. & GIL-DELGADO, J. A.1986. Aves nidificantes de la provincia de Alicante. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante.

SENDÍN GIL, CARLOS. 1996. Las poblaciones de aves acuáticas del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola: Composición, diversidad y evolución. Bases para la gestión de la biocenosis. Inédito.

SEO-Alicante. 2001. Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico de Alicante 1999.

SEO/BirdLife. Atlas de las aves de España 1975-1995. 1997. Lynx edicions. Barcelona.

TELLERIA, J.L., ASENSIO, B. & DIAZ, M. 1999. Aves Ibéricas II. Paseriformes. J. M. Reyero Editor

URIOS, V.; ESCOBAR, J.V.; PARDO, R.; & GÓMEZ, J.A. 1991. Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. Valencia.

URIOS, V.; GÓMEZ, J. A.; PARDO, R. & MARTÍNEZ, R. 1989. Capítulo 5 dedicado a avifauna (págs. 127- 270), en GUÍA DE LA NATURALEZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Edita el diario Levante-El mercantil valenciano.

VARIOS AUTORES. Crónica Ornitológica de LA MATRUCA (Revista de la Asociación de los Amigos de los Humedales del sur de Alicante, números 1 al 12).

VARIOS AUTORES. 1985. La Reserva Marina de la isla Plana o Nueva Tabarca. A. Ramos (ed.). Alicante.

VARIOS AUTORES. 1991. Estudios sobre la Reserva Marina de Tabarca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.

VARIOS AUTORES. 1996. Estudios sobre áreas marinas protegidas e islas del Mediterráneo español. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.

CON LA COMPRA DE ESTE LIBRO
ESTAS COLABORANDO EN LA PROTECCIÓN
DE LOS ESPACIOS NATURALES
DEL SUR DE ALICANTE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LOS HUMEDALES
DEL SUR DE ALICANTE
APARTADO DE CORREOS 292 ELX
03280 ALICANTE

www.asha.org.es

AHSA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS HUMEDALES DEL SUR DE ALICANTE